令和7年産 水稲(神戸市北区) 病害虫発生状況調査表

事務所名: 神戸事務所

調査月日/第4回(令和7年8月19日)

					(調査	株 数:	25 株)				
調査地区名	田植え又	葉い	もち	穂い	もち	紋木	占病	編葉	枯病	イネツトムシ	コブノ	メイガ	
	は出穂期	発病 株数	発病度	発病 株数	発病 穂数	発病 株数	発病 株率	発病 株数	発病度	ツト数	ツト数	被害 株率	使用農薬名 (箱施用剤)
		株	%	株	穂	株	%	株	%	株	株	%	
山田 (コシ)			0.0				0.0		0.0			0.0	
山田(山田)			0.0				0.0		0.0			0.0	
淡河 (キヌ)			0.0				0.0		0.0			0.0	
上淡河(キヌ)			0.0				0.0		0.0			0.0	
上淡河(山田)			0.0				0.0		0.0			0.0	
道場(山田)			0.0				0.0		0.0			0.0	
大沢(コシ)			0.0				0.0		0.0			0.0	
大沢(山田)			0.0				0.0		0.0			0.0	
長尾(山田)			0.0				0.0		0.0			0.0	
八多(キヌ)			0.0				0.0		0.0			0.0	
八多(山田)			0.0				0.0		0.0			0.0	
			0.0				0.0		0.0			0.0	
計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
平 均		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

令和7年産 水稲(神戸市北区) 病害虫発生状況調査表

事務所名: 神戸事務所

調查月日/第4回(令和7年8月19日)

																					印刊上	エノリ	н /	2777		(11 \	H 1 -	T0)	月19日)	-
調査地区名 田植え又 は出穂期	_ 14.5 _		払い落とし(10株)													すくい取り(往復10回振り、ただしカメムシ類は20回振り)														
		ツマ		ブロヒノ		ニメトヒ	メトビ		セジロ			トビイロ			ツマグロ		ヒメトビ			セジロ			トビイロ			カメムシ類			使用農薬名 (箱施用剤)	
	120 110000	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	(40%6/11/11/	
				頭			頭			頭			頭			頭			頭			頭			頭			頭		
山田(コシ)				0		1	1	1	6	7			0			0	3	1	4	1		1			0	1		1		
山田(山田)		1	3	4			0	1	9	10			0			0			0			0			0			0		
淡河(キヌ)				0			0		1	1			0	1		1	7	5	12	2	17	19			0			0		
上淡河(キヌ)				0			0		2	2			0			0			0			0			0			0		
上淡河(山田)				0		1	1		1	1			0			0	2		2	8		8			0			0		
道場(山田)				0			0			0			0			0			0			0			0			0		
大沢(コシ)				0			0			0			0			0			0			0			0			0		
大沢(山田)				0			0			0			0			0			0			0			0			0		
長尾(山田)				0			0			0			0			0			0			0			0			0		
八多(キヌ)				0			0	3	1	4			0			0			0			0			0			0		払い落とし:カメムシ幼虫2
八多(山田)				0			0	1		1			0			0			0			0			0			0		
				0			0			0			0			0			0			0			0			0		
計		1	3	4	0	2	2	6	20	26	0	0	0	1	0	1	12	6	18	11	17	28	0	0	0	1	0	1		
平 均		0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0		