

令和7年産 水稻(神戸市西区) 病虫害発生状況調査表

事務所名: 神戸事務所 担当者名: 羽田

調査月日/第3回 (令和7年7月23日)

調査地区名	田植え又は出穂期	(調 査 株 数 : 25 株)											使用農薬名 (箱施用剤)
		葉いもち		穂いもち		紋枯病		縞葉枯病		イネツトムシ	コブノメイガ		
		発病 株数	発病度	発病 株数	発病 穂数	発病 株数	発病 株率	発病 株数	発病度	ツト数	ツト数	被害 株率	
		株	%	株	穂	株	%	株	%	株	株	%	
伊川谷			0.0				0		0.0			0.0	
櫛谷			0.0				0		0.0	1		0.0	
押部谷			0.0			2	8		0.0			0.0	
神出			0.0				0		0.0			0.0	
平野			0.0				0		0.0			0.0	
玉津			0.0				0		0.0			0.0	
岩岡(コシカ)			0.0				0		0.0			0.0	
岩岡(早期コシ)			0.0				0		0.0			0.0	
計		0	0	0	0	2	8	0	0	1	0	0	
平 均		0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	

ジャンボタニシ確認

令和7年産 水稻(神戸市西区) 病虫害発生状況調査表

事務所名: 神戸事務所 担当者名: 羽田

調査月日/第3回 (令和7年7月23日)

調査地区名	田植え又は出穂期	払い落とし(10株)												すくい取り(往復10回振り、ただしカメムシ類は20回振り)															使用農薬名 (箱施用剤)
		ツマグロ			ヒメトビ			セジロ			トビイロ			ツマグロ			ヒメトビ			セジロ			トビイロ			カメムシ類			
		成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	
				頭			頭			頭			頭			頭			頭			頭			頭			頭	
伊川谷			2	2		1	1		10	10			0		3	3		2	2		6	6			0			0	
櫛谷				0	1	15	16			0			0			0	1		1	1		1			0			0	
押部谷				0			0			0			0			0	3		3			0			0			0	
神出				0	1	1	2			0			0			0			0			0			0			0	
平野				0		1	1			0			0			0	4		4	1		1			0			0	
玉津				0		7	7	2	23	25			0			0	1		1	1	2	3			0			0	
岩岡(コシ)				0	3		3			0			0			0			0			0			0			0	
岩岡(早期コシ)				0			0			0			0			0			0			0			0			0	
計		0	2	2	5	25	30	2	33	35	0	0	0	0	3	3	9	2	11	3	8	11	0	0	0	0	0	0	
平均		0	0	0	1	3	4	0	4	4	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	

すくい取り:ニカメイチュウ1