令和6年度　水稲病虫害発生状況調査表

《病虫害調査》

調査回　2回目　調査月日　令和6年8月5日

		払い落とし（１０株）																														
		ツマグロ			ヒメトビ			セジロ			トビイロ			カメムシ			イネアオムシ			コブノメイガ			ツマグロヨコバイ									
		成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	
別所	和田					3	3	2	19	21																						1
久留美	宿原					3	3		12	12																						2
志染	井上				2	70	72	10	81	91					2	2																3
細川	桃津				1	123	124	7	55	62																						4
口吉川	保木				4		4	5		5																						5
東吉川	市野瀬					10	10		20	20																						6
中吉川	長谷							2	39	41																						7
上吉川	福井				1	34	35		36	36																						8
					8	243	251	26	262	288					2	2																計

		すくい取り（往復５回振り）																														
		ツマグロ			ヒメトビ			セジロ			トビイロ			カメムシ			コブノメイガ			フタオビコヤカ			（バッタ）									
		成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	
別所	和田																															1
久留美	宿原				1	1	2	3	4	7																						2
志染	井上				14	195	209	10	38	48																						3
細川	桃津							9	20	29																						4
口吉川	保木					24	24	10	47	57																						5
東吉川	市野瀬							1		1																						6
中吉川	長谷								1	1																						7
上吉川	福井							1		1																						8
					15	220	235	34	110	144																						計

		見取り（５０株）																														
		いもち病(５０株)							紋枯病(５０株)							ﾆｶﾒｲｶﾞ		ｲﾈﾂﾄﾑｼ		ｺﾌﾞﾉﾒｲｶﾞ		その他										
		A	B	C	D	率	度	E	A	B	C	D	率	度	E	被害株数	率	つと数	率	つと数	率	ｲﾅｺﾞ幼虫	ｺﾔｶﾞ幼虫	疑似紋枯れ	バッタ	ウンカ	除草剤薬害	フタオビコガヤ				
別所	和田							50							50																	1
久留美	宿原							50							50																	2
志染	井上			20	4	48	44	50							50																	3
細川	桃津							50							50																	4
口吉川	保木							50							50																	5
東吉川	市野瀬							50							50																	6
中吉川	長谷							50							50																	7
上吉川	福井							50							50																	8
平均/計						6	6																									計