

	調査 地区名	調査圃 作付品種	調査圃 田植日	病害(抽出25株中の発病株数)								害 虫 発 生 状 況								その他	
				葉いもち		穂いもち		紋枯病		縞葉枯病		ツマグロ ヨコバイ	ヒメビ ウンカ	セジロ ウンカ	トビイロ ウンカ	バッタ類	フタオビ コヤガ	カメムシ 類	イネ カメムシ	箱施用剤	備考
				発病 株数	発病 程度	発病 株数	発病 程度	発病 株数	発病 程度	発病 株数	発病 程度	発生 程度	発生 程度	発生 程度	発生 程度	発生 程度	発生 程度	発生 程度	発生 程度	有・無	
赤 穂	新 田	きぬむすめ	6/15										少	少				少			
	高 雄	ヒノヒカリ	6/8	3株	少			3株	少			少	少	少							
	西有年	キヌヒカリ	5/30	1株	少							少		少				中	多		
	有年原	ヒノヒカリ	6/7	2株	少			1株	少				少	少							
上 郡	宇治山	ヒノヒカリ	6/5	15株	少							少	少	少		少		少			
	野 桑	コシヒカリ	5/10											少				中			
	大 枝	ヒノヒカリ	6/8	5株	少							少		少		少		多	多		
	八保乙	きぬむすめ	5/31										少	少		少					
相 生	那波野	きぬむすめ	6/17	22株	少							少	少	少		少		少			
	野々	ヒノヒカリ	6/13	13株	少													少			
	森	キヌヒカリ	5/27	18株	少							少	少			少		少	中		

※ 発病程度は、無、少、中、多、甚の5段階評価です。 (病気の発病程度は病斑の進行具合により評価しています。)