

	調査地区名	調査圃作付品種	調査圃田植日	病害(抽出25株中の発病株数)								害虫発生状況								その他	
				葉いもち		穂いもち		紋枯病		縞葉枯病		ツマグロヨコバイ	ヒメビウンカ	セジロウンカ	トビイロウンカ	バッタ類	フタオビコヤガ	カメムシ類	イネカメムシ	箱施用剤	備考
				発病株数	発病程度	発病株数	発病程度	発病株数	発病程度	発病株数	発病程度	発生程度	発生程度	発生程度	発生程度	発生程度	発生程度	発生程度	発生程度	有・無	
赤穂	新田	きぬむすめ	6/15	1株	少													多			
	高雄	ヒノヒカリ	6/8															多			
	西有年	キヌヒカリ	5/30													中	多				
	有年原	ヒノヒカリ	6/7	3株	少			9株	少					少			中				
上郡	宇治山	ヒノヒカリ	6/5	25株	少											中	多				
	野桑	コンヒカリ	5/10											少		少					
	大枝	ヒノヒカリ	6/8	5株	少			1株	少							中					
	八保乙	きぬむすめ	5/31											少		少	多				
相生	那波野	きぬむすめ	6/17	25株	少									中	少	少					
	野々	ヒノヒカリ	6/13	9株	少												多				
	森	キヌヒカリ	5/27	9株	少									少			多				

※ 発病程度は、無、少、中、多、甚の5段階評価です。

(病気の発病程度は病斑の進行具合により評価しています。)