

水稻病虫害防除情報

第3号（8月29日発行）

発行者	兵庫県農業共済組合赤相事務所	(0791) 45-1101
連絡先	光都農業改良普及センター	(0791) 58-2209
	兵庫西農業協同組合	
	西播磨営農生活センター	(0791) 52-2224
	相生市農業協同組合	(0791) 22-0676

1 水稻の生育状況・病虫害発生状況

7月下旬から8月下旬までは記録的な猛暑となり、気温は平年より高くなりました。気象庁による今後1ヶ月間の予報でも平年より高くなると予想されています。7月下旬以降の降水量は非常に少ない状態でしたが、地域によって夕立となることもありました。

▶生育調査結果（8月27日調査）

品種（調査地点）	草丈（cm）	茎数（本/株）	備考
ヒノヒカリ（赤穂市高雄）	稈長 88.2 穂長 17.4	穂数 20.4	移植日 6月8日
キヌヒカリ（相生市森）	稈長 81.6 穂長 19.1	穂数 15.9	移植日 5月27日
ヒノヒカリ（上郡町大枝）	稈長 94.0 穂長 20.0	穂数 26.1	移植日 6月8日

▶病虫害調査結果（8月27日調査）

病虫害名	調査結果の概要
いもち病	各地で発生していますが発病程度は少ないです。
紋枯病	一部で発生しています。
縞葉枯病	今回の調査では確認していません。
ウンカ類・ツマグロヨコバイ	各地で発生していますが発生程度は少ないです。
カメムシ類	各地で発生しており、発生程度は多いです。
イネカメムシ	各地で発生しており、発生程度もかなり多いです。

2 病虫害の防除

ほ場を確認し、カメムシが見られる場合は防除してください。又、坪枯れの発生が見られた場合も、速やかに防除してください。

病虫害	薬剤名	使用基準
ウンカ類 カメムシ類	トレボン乳剤	収穫14日前まで 3回以内
	トレボン粉剤DL 又はスタークル液剤10	収穫7日前まで 3回以内

※薬剤は使用量等登録内容を十分確認し適切にご使用ください。

※薬剤に関する詳細は、光都農業改良普及センター、兵庫西農業協同組合、相生市農業協同組合（上記連絡先）までお問い合わせください。

3 その他

① キヌヒカリ等極早生品種の収穫は、刈り取り適期幅が狭いので、刈り遅れないように注意しましょう。

② 早期落水による田面の過乾燥は、登熟不足や胴割れ、乳白米の原因となりますので刈り取りの7～10日前まで適度な湿りを保ちましょう。

農薬の飛散防止に努めましょう。作業中の熱中症対策を忘れずに！