

赤相地域（赤穂市・上郡町・相生市）

令和7年

水稲病虫害防除情報

第2号（8月8日発行）

発行者	兵庫県農業共済組合赤相事務所	(0791) 45-1101
連絡先	光都農業改良普及センター	(0791) 58-2209
	兵庫西農業協同組合	
	西播磨営農生活センター	(0791) 52-2224
	相生市農業協同組合	(0791) 22-0676

1 水稲の生育状況・病虫害発生状況

7月上旬以降の気象状況は、平均気温は高く、降水量は平年より少なく、日照時間は多く推移しており、今後1か月予報も同様の傾向が続くとされています。

5月下旬、6月上旬移植では、草丈は平年並みで、茎数はやや多く推移しています。

▶生育調査結果（8月5日調査）

品種（調査地点）	草丈（cm）	茎数（本／株）	備考
ヒノヒカリ（赤穂市高雄）	87.6	22.3	移植日 6月7日
キヌヒカリ（相生市森）	稈長 67.0 穂長 17.9	穂数 23.5	移植日 5月29日
ヒノヒカリ（上郡町大枝）	86.1	28.7	移植日 6月9日

▶病虫害調査結果（8月5日調査）

病虫害名	調査結果の概要
いもち病	ごく一部で病斑は見られますが広がりは見られません。
紋枯病	今回の調査では確認していません。
縞葉枯病	今回の調査では確認していません。
ウンカ類・ツマグロヨコバイ	各地で発生していますが発生程度は少ないです。
カメムシ類	各地で発生しています。
イネカメムシ	各地で発生しています。

2 病虫害の防除

- ①カメムシ類 7月17日に病虫害防除所から斑点米カメムシ類の注意報が発表されました。

イネカメムシには出穂直後と出穂8日後にトレボン乳剤又はスタークル液剤10を散布して下さい。

- ②紋 枯 病 高温が続くと多発生しやすいので、多施肥、過剰分けつ田では注意が必要です。

- ③カメムシ類、ウンカ類等の被害を防ぐため、栽培こよみを参考に防除を徹底してください。

品種	防除時期	主な薬剤名
ヒノヒカリ	8月中旬	ピームトレモンセレン粉剤DL

※住宅地の近辺など粉剤防除が難しい場合は粒剤防除を！（粉剤より少し早めに）

品種	防除時期	主な薬剤名
ヒノヒカリ	8月上中旬	コラトップトレボン粒剤

☆薬剤は使用量等登録内容を十分確認し適切にご使用ください。

※薬剤に関する詳細は、光都農業改良普及センター、兵庫西農業協同組合、相生市農業協同組合（上記連絡先）までお問い合わせください。

3 水管理

中干し後は、間断かん水で根の活力を維持しましょう。

4 その他

イナゴ類やカメムシ類の水田侵入を減らすため、出穂2週間前までの畦草刈りを徹底しましょう。

農薬の飛散防止に努めましょう。作業中の熱中症対策を忘れずに！

次回発行予定 8月29日です

令和7年度 第2回

水稲病害虫発生状況調査 結果一覧表

調査日：令和7年8月5日

天候： 晴れ

兵庫県農業共済組合 赤相事務所

	調査 地区名	調査圃 作付品種	調査圃 田植日	病害(抽出25株中の発病株数)								害 虫 発 生 状 況								その他	
				葉いもち		穂いもち		紋枯病		縞葉枯病		ツマグロ ヨコバイ	ヒメトビ ウンカ	セジロ ウンカ	トビイロ ウンカ	バッタ類	フタオビ コヤガ	カメムシ	イネ カメムシ	箱施用剤	備考
				発病 株数	発生 程度	発病 株数	発生 程度	発病 株数	発生 程度	発病 株数	発生 程度	発生 程度	発生 程度	発生 程度	発生 程度	発生 程度	発生 程度	発生 程度	発生 程度	有・無	
赤 穂	新 田	きぬむすめ	6/13										少	少					少		
	高 雄	ヒノヒカリ	6/7										少			少		少			
	西有年	きぬむすめ	5/28									少	少	少				少			
	有年原	ヒノヒカリ	6/7										少			少					
上 郡	宇治山	ヒノヒカリ	6/7									少									
	金出地	コシヒカリ	4/28									少	少	中					少		
	大 枝	ヒノヒカリ	6/9									少	少	少				少			
	上栗原	きぬむすめ	6/7	5株	少							少	少	少		少		少	少		
相 生	那波野	きぬむすめ	6/8													少					
	野々	ヒノヒカリ	6/16											少							
	森	キヌヒカリ	5/29											少		多					

※ 発生程度は、無、少、中、多、甚の5段階評価です。

(病気の発生程度は病斑の進行具合により評価しています。)