

(様式16-5-②)

令和7年度 水稻病虫害発生状況調査表 (No.2)

組合等名 / 兵庫県農業共済組合 赤相事務所

調査月日 / 第3回 (令和7年8月26日)

調査地区名	品種		葉いもち		穂いもち		紋枯病		縞葉枯病						使用農薬名 (箱施用剤)
			発病	発病	発病	発病	発病	発病	発病	発病	発病	発病	発病	発病	
	田植え日		株数	株率	株数	株率	株数	株率	株数	株率	株数	株率	株数	株率	
新 田	きぬむすめ	6/13	株 / 25	%	株 / 25	%	1 株 / 25	4 %	株 / 25	%	株 / 25	%	株 / 25	%	フルスロットル
高 雄	ヒノヒカリ	6/7	株 / 25	%	株 / 25	%	2 株 / 25	8 %	株 / 25	%	株 / 25	%	株 / 25	%	ツインターボ ⁺ フェルテラ
西有年	きぬむすめ	5/28	4 株 / 25	16 %	株 / 25	%	株 / 25	%	株 / 25	%	株 / 25	%	株 / 25	%	フルスロットル
有年原	ヒノヒカリ	6/7	株 / 25	%	株 / 25	%	3 株 / 25	12 %	株 / 25	%	株 / 25	%	株 / 25	%	ブーセンセ ⁺ クテラ
宇治山	ヒノヒカリ	6/7	1 株 / 25	4 %	株 / 25	%	株 / 25	%	株 / 25	%	株 / 25	%	株 / 25	%	ヨーハ ⁺ ルハ ⁺ リーEV
金出地	コシヒカリ	4/28	16 株 / 25	64 %	株 / 25	%	株 / 25	%	株 / 25	%	株 / 25	%	株 / 25	%	カウンスルコンフ ⁺ リート
大 枝	ヒノヒカリ	6/9	3 株 / 25	12 %	株 / 25	%	株 / 25	%	株 / 25	%	株 / 25	%	株 / 25	%	ヨーハ ⁺ ルハ ⁺ リーEV
上栗原	きぬむすめ	6/7	15 株 / 25	60 %	株 / 25	%	株 / 25	%	株 / 25	%	株 / 25	%	株 / 25	%	ブーソアレス
那波野	きぬむすめ	6/8	株 / 25	%	株 / 25	%	株 / 25	%	株 / 25	%	株 / 25	%	株 / 25	%	フルスロットル
野々	ヒノヒカリ	6/16	株 / 25	%	株 / 25	%	株 / 25	%	株 / 25	%	株 / 25	%	株 / 25	%	フルスロットル ジェイソウル
森	キヌヒカリ	5/29	株 / 25	%	株 / 25	%	株 / 25	%	株 / 25	%	株 / 25	%	株 / 25	%	ヨーハ ⁺ ルハ ⁺ リーEV モンガレス箱粒剤
計			39 株 / 275	14.2 %	株 / 275	%	6 株 / 275	2.2 %	株 / 275	%	株 / 275	%	株 / 275	%	
平 均			3.5 株 / 25	14 %	株 / 25	%	0.5 株 / 25	2 %	株 / 25	%	株 / 25	%	株 / 25	%	
補植苗又は付近 の発生状況等															

(様式16-5-③)

令和7年度 水稻病虫害発生状況調査表 (No.3)

組合等名 / 兵庫県農業共済組合 赤相事務所

調査月日 / 第3回 (令和7年8月26日)

調査地区名	品種		払い落とし (10 株)												すくい取り (往 復 5 回 振 り)															備 考	
			ツマグロ			ヒメトビ			セジロ			トビイロ			ツマグロ			ヒメトビ			セジロ			トビイロ			カメムシ類				
			成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計		
新 田	きぬむすめ	6/13			頭			頭			頭			頭			頭			頭			頭			頭			13	13	イネカメ2
高 雄	ヒノヒカリ	6/7				3	5	8							10		10										2	7	9	アカスジカスミカ メムシ1	
西有年	きぬむすめ	5/28							1	3	4						2	6	8	2	92	94						3		3	イネカメ1
有年原	ヒノヒカリ	6/7					1	1	1		1						4	28	32	3		3									
宇治山	ヒノヒカリ	6/7		6	6					4	4				1	1	2		1	1		1	1						1	1	イネカメ1
金出地	コシヒカリ	4/28		6	6		4	4		13	13				10	2	12	2	5	7	2	34	36					4		4	
大 枝	ヒノヒカリ	6/9														1	1	1	2	3		6	6					9		9	
上栗原	きぬむすめ	6/7				3	1	4	2	7	9							12	1	13	2	3	5								
那波野	きぬむすめ	6/8		1	1	1		1		1	1				3		3											3		3	
野々	ヒノヒカリ	6/16		1	1					1	1																				
森	キヌヒカリ	5/29					3	3	1	1	2							34	34	1	3	4							5	5	イネカメ5
計				14	14	7	14	21	5	30	35				14	4	18	32	84	116	10	147	157					21	26	47	
平 均				1.3	1.3	0.6	1.3	1.9	0.5	2.7	3.2				1.3	0.4	1.6	2.9	7.6	10.5	0.9	13.4	14.3					1.9	2.4	4.3	

以上

(様式16-5-A)

令和7年度 水稻病虫害発生状況調査表 (No.4)

組合等名 / 兵庫県農業共済組合 赤相事務所
調査月日 / 第3回 (令和7年8月26日)

調査地区名	そ の 他 の 害 虫															そ の 他 の 病 気						
	バッタ			コブノメイガ			イネツトムシ			アワヨトウ			フタオヒコヤガ			胡 麻 葉枯病	籾 枯 細菌病	ばか苗病	白葉枯病	稲こうじ病	黄化 萎縮病	
	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計							
新 田			頭			頭			頭			頭			頭	%	%	%	%	%	%	%
高 雄																						
西有年	8		8																			
有年原																						
宇治山																						
金出地																						
大 枝																						
上栗原																						
那波野	2		2																			
野々																						
森																						
計	10		10																			
平 均	0.9		0.9																			

3部 (控、本所②)

以上

令和7年度 水稻 生育診断圃調査票

1 調査筆の概要

地区名	圃場の地名・地番	作付面積(a)	基準単収(kg)	品種名	移植（播種）日
高 雄	目坂 タケノクボ1000-1,1000-2	26.1	490	ヒノヒカリ	2025/6/7

2 生育調査

調査箇所 ※（ ）は調査日		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	合計	平均
分けつ期 (7月8日)	草丈	54.0	50.0	53.0	55.0	53.0	51.0	45.0	52.0	60.5	58.0		53.2cm
	茎数	23	9	25	18	25	18	11	20	37	20	206本	20.6本
穂揃い期 (8月5日)	草丈	86.0	86.0	83.0	87.0	88.0	89.0	91.0	88.0	87.0	91.0		87.6cm
	茎数	26	24	13	22	22	25	22	29	13	27	223本	22.3本
	稈長												0.0cm
	穂長												0.0cm
	穂数											0本	0.0本
成熟期 (8月26日)	草丈	122.0	117.0	119.0	116.0	138.0	122.0	122.0	121.0	114.0	123.0		121.4cm
	茎数											0本	0.0本
	稈長												0.0cm
	穂長	14.5	13.0	16.5	16.0	18.0	19.0	16.0	14.0	17.0	13.5		15.8cm
	穂数	24	23	12	22	19	23	21	28	11	28	211本	21.1本

地区名	圃場の地名・地番	作付面積(a)	基準単収(kg)	品種名	移植(播種)日
森	森 74 512,513	27.9	500	キヌヒカリ	2025/5/29

調査箇所 ※ () は調査日		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	合計	平均
分げつ期 (7月8日)	草丈	58.2	58.0	54.0	56.4	58.0	58.0	55.8	56.8	55.6	55.2		56.6cm
	茎数	27	27	23	26	25	21	28	21	20	28	246本	24.6本
穂揃い期 (8月5日)	草丈	83.0	86.3	84.5	86.5	86.0	85.8	88.2	84.4	83.5	80.7		84.9cm
	茎数	28	27	23	27	25	17	26	20	20	22	235本	23.5本
	稈長	65.7	69.8	67.7	68.1	67.0	66.6	69.5	66.4	65.8	63.2		67.0cm
	穂長	17.3	16.5	16.8	18.4	19.0	19.2	18.7	18.0	17.7	17.5		17.9cm
	穂数	28	27	23	27	25	17	26	20	20	22	235本	23.5本
成熟期 (8月26日)	草丈												0.0cm
	茎数											0本	0.0本
	稈長	74.6	63.5	67.2	75.2	73.0	64.0	67.2	72.2	68.0	73.0		69.8cm
	穂長	17.8	16.8	15.0	14.4	14.6	16.4	17.2	14.6	16.0	14.2		15.7cm
	穂数	27	26	22	27	25	17	26	23	21	20	234本	23.4本
													0.0cm

1 調査筆の概要

地区名	圃場の地名・地番	作付面積(a)	基準単収(kg)	品種名	移植(播種)日
大 枝	大枝 タカタ 211,212	29.2	510	ヒノヒカリ	2025/6/9

2 生育調査

調査箇所 ※ () は調査日		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	合計	平均
分けつ期 (7月8日)	草丈	46.0	46.0	46.0	49.0	44.0	46.0	48.0	44.0	45.0	47.0	/	46.1cm
	茎数	34	28	37	26	32	29	37	25	37	34	319本	31.9本
穂揃い期 (8月5日)	草丈	89.0	85.0	87.5	85.0	85.0	85.5	88.0	85.5	85.0	85.0	/	86.1cm
	茎数	29.0	28.0	34.0	28.0	29.0	25.0	30.0	24.0	30.0	30.0	287本	28.7本
	稈長											/	0.0cm
	穂長											/	0.0cm
	穂数											0本	0.0本
成熟期 (8月26日)	草丈											/	0.0cm
	茎数											0本	0.0本
	稈長	91.0	89.0	92.0	93.0	88.0	85.5	80.0	82.0	91.0	87.0	/	87.9cm
	穂長	17.0	17.5	17.0	17.5	19.5	20.0	22.0	21.0	17.0	18.0	/	18.7cm
	穂数	27	28	23	32	26	34	29	28	26	25	278本	27.8本