

水稲病害虫防除情報

第3号（8月28日発行）

発行者	兵庫県農業共済組合西播支所	(0791) 63-4800
連絡先	光都農業改良普及センター	(0791) 58-2209
	兵庫西農業協同組合	
	西播磨営農生活センター	(0791) 52-2224
	相生市農業協同組合	(0791) 22-0676

1 水稲の生育状況・病害虫発生状況

7月下旬以降の気象状況は、平年に比べて、平均気温は高く、日照時間は多く推移し、降水量については、まとまった降雨の日は少なく、全体としても少ない量となりました。気象庁による今後1ヶ月間の予報でも同様の傾向が続くとされています。5月下旬、6月上旬移植では、草丈、穂数ともに平年並みで推移しています。

▶生育調査結果（8月25日調査）

品種（調査地点）	草丈（cm）	穂数（本／株）	備考
ヒノヒカリ（赤穂市高雄）	108.8	21.2	移植日 6月6日
コノホシ（相生市矢野町上）	稈長 78.9 穂長 19.8	20.5	移植日 5月31日
きぬむすめ（上郡町上栗原）	稈長 87.3 穂長 17.4	16.7	移植日 6月6日

▶病害虫調査結果（8月25日調査）

病害虫名	調査結果の概要
いもち病	今回の調査では確認していません。
紋枯病	ごく一部で病斑が見られます。
縞葉枯病	今回の調査では確認していません。
ウンカ類・ツマグロヨコバイ	各地で発生しています。
カメムシ類	各地で発生しており、発生程度は前回よりやや少ないです。
イネカメムシ	各地で発生しています。発生程度は少ないです。

2 病害虫の防除

ほ場を確認し、カメムシが見られる場合は防除してください。又、坪枯れの発生が見られた場合も、速やかに防除してください。

病 害 虫	薬 剤 名	使 用 基 準
ウンカ類 カメムシ類	トレボン乳剤	収穫14日前まで 3回以内
	トレボン粉剤DL 又はスタークル液剤10	収穫7日前まで 3回以内

※薬剤は使用量等登録内容を十分確認し適切にご使用ください。

※薬剤に関する詳細は、光都農業改良普及センター、兵庫西農業協同組合、相生市農業協同組合（上記連絡先）までお問い合わせください。

3 その他

①キヌヒカリ等極早生品種の収穫は、刈り取り適期幅が狭いので、刈り遅れないように注意しましょう。

②早期落水による田面の過乾燥は、登熟不足や胴割れ、乳白米の原因となりますので、刈り取りの7～10日前まで適度な湿りを保ちましょう。

農薬の飛散防止に努めましょう。作業中の熱中症対策を忘れずに！