

水稻病虫害発生予察調査報告野帳（標準様式）

調査年月日：令和8年9月2日

調査場所：たつの市揖西町竹原

作型：キヌヒカリ

← ※早期・普通期又は品種名を記載

調査基準(病害)

葉いもち病 A: 下葉は枯死し完全なスリコミ症状

B: かなり病斑がみられ軽いスリコミ症状を呈する

C: かなり見られる

D: 病斑がわずかに見られる

E: 病斑なし

穂いもち A: 穂首部が罹病し白穂になったもの又はこのためかなり不稔を起こしている

B: 穂首部以外で一次枝梗以上が侵され枯死

紋枯病 A: 半数以上の茎が発病しほとんどが止葉から穂首まで侵され止葉が枯死の状態

B: 株の半数以上の茎が発病、病斑が止葉葉鞘まで達しているが止葉は生色ある

C: 株の半数以上の茎が発病し大部分の病斑が第二葉鞘まで達している

D: 病斑が第3葉鞘まで達している

E: 全く発病を認めない又は第4葉鞘以下の発病

縞葉枯病 A: 株のほとんどの茎が発病している

B: 株の2/3以上の茎が発病している

C: 株の1/3～2/3の茎が発病している

D: 株の1/3以下の茎が発病している

E: 発病が認められない

病害	A	B	C	D	E	(記入方法)
葉いもち病(25株)					25	右記の調査基準に基づき該当する株数を記入
穂いもち病(5株) ※5株の中の穂数を記入						
紋枯病(25株)					25	
縞葉枯病(25株)					25	
その他()					25	
特記事項						

D欄には5株の合計穂数を記入

穂いもち

虫害

すくいとり10回振	成虫	幼虫	種類名	合計
ヒメビウンカ	1	13		14
セジロウンカ				0
トビイロウンカ				0
ツマグロヨコバイ				0
すくいとり10回振	成虫	幼虫	種類名	合計
斑点米カメムシ類				0
払い落とし10株	成虫	幼虫		合計
ヒメビウンカ				0
セジロウンカ				0
トビイロウンカ				0
イナズマヨコバイ				0
見取り(25株)	虫数/つと数	被害株数		発生株率
ニカメイガ(被害株数)				0.0
イネミスゾウムシ(虫数)				
イネツトムシ(つと数)				
コブノメイガ(つと数)				
その他()				
特記事項				

水稻病虫害発生予察調査報告野帳（標準様式）

調査年月日：令和8年9月2日

調査場所：たつの市神岡町大住寺

作型：ヒノヒカリ

← ※早期・普通期又は品種名を記載

調査基準(病害)

葉いもち病 A: 下葉は枯死し完全なスリコミ症状

B: かなり病斑がみられ軽いスリコミ症状を呈する

C: かなり見られる

D: 病斑がわずかに見られる

E: 病斑なし

穂いもち

A: 穂首部が罹病し白穂になったもの又はこのためかなり不稔を起している

B: 穂首部以外で一次枝梗以上が侵され枯死

紋枯病

A: 半数以上の茎が発病しほとんどが止葉から穂首まで侵され止葉が枯死の状態

B: 株の半数以上の茎が発病、病斑が止葉葉鞘まで達しているが止葉は生色ある

C: 株の半数以上の茎が発病し大部分の病斑が第二葉鞘まで達している

D: 病斑が第3葉鞘まで達している

E: 全く発病を認めない又は第4葉鞘以下の発病

縞葉枯病

A: 株のほとんどの茎が発病している

B: 株の2/3以上の茎が発病している

C: 株の1/3～2/3の茎が発病している

D: 株の1/3以下の茎が発病している

E: 発病が認められない

病害	A	B	C	D	E	(記入方法)
葉いもち病(25株)				1	24	右記の調査基準に基づき該当する株数を記入
穂いもち病(5株) ※5株の中の穂数を記入						
紋枯病(25株)				3	22	
縞葉枯病(25株)					25	
その他()					25	
特記事項						

D欄には5株の合計穂数を記入

虫害

すくいとり10回振	成虫	幼虫	種類名	合計
ヒメビウンカ		19		19
セジロウンカ	7			7
トビイロウンカ				0
ツマグロヨコバイ				0
すくいとり10回振	成虫	幼虫	種類名	合計
斑点米カメムシ類	1			1
払い落とし10株	成虫	幼虫		合計
ヒメビウンカ		8		8
セジロウンカ				0
トビイロウンカ				0
ツマグロヨコバイ				0
見取り(25株)	虫数/つと数	被害株数		発生株率
ニカメイガ(被害株数)				0.0
イネミスゾウムシ(虫数)				
イネツムシ(つと数)				
コブノメイガ(つと数)				
その他()				
特記事項				

水稻病虫害発生予察調査報告野帳（標準様式）

調査年月日：令和8年9月2日

調査場所：たつの市新宮町下野田

作型：ヒノヒカリ

← ※早期・普通期又は品種名を記載

調査基準(病害)

葉いもち病 A: 下葉は枯死し完全なスリミ症状

B: かなり病斑がみられ軽いスリミ症状を呈する

C: かなり見られる

D: 病斑がわずかに見られる

E: 病斑なし

穂いもち

A: 穂首部が罹病し白穂になったもの又はこのためかなり不稔を起こしている

B: 穂首部以外で一次枝梗以上が侵され枯死

紋枯病

A: 半数以上の茎が発病しほとんどが止葉から穂首まで侵され止葉が枯死の状態

B: 株の半数以上の茎が発病、病斑が止葉葉鞘まで達しているが止葉は生色ある

C: 株の半数以上の茎が発病し大部分の病斑が第二葉鞘まで達している

D: 病斑が第3葉鞘まで達している

E: 全く発病を認めない又は第4葉鞘以下の発病

縞葉枯病

A: 株のほとんどの茎が発病している

B: 株の2/3以上の茎が発病している

C: 株の1/3～2/3の茎が発病している

D: 株の1/3以下の茎が発病している

E: 発病が認められない

病害	A	B	C	D	E	(記入方法)
葉いもち病(25株)				13	12	右記の調査基準に基づき該当する株数を記入
穂いもち病(5株) ※5株の中の穂数を記入						
紋枯病(25株)				5	20	
縞葉枯病(25株)					25	
その他()					25	
特記事項						

D欄には5株の合計穂数を記入

虫害

すくいとり10回振	成虫	幼虫	種類名	合計
ヒメビウンカ		12		12
セジロウンカ	60			60
トビイロウンカ				0
ツマゲロコバイ	7	6		13
すくいとり10回振	成虫	幼虫	種類名	合計
斑点米カメムシ類				0
払い落とし10株	成虫	幼虫		合計
ヒメビウンカ	2	10		12
セジロウンカ	1	1		2
トビイロウンカ				0
ツマゲロコバイ		3		3
見取り(25株)	虫数/つと数	被害株数		発生株率
ニカメイガ(被害株数)				0.0
イネミスゾウムシ(虫数)				
イネツムシ(つと数)				
コブノメイガ(つと数)				
その他()				
特記事項				

水稻病虫害発生予察調査報告野帳（標準様式）

調査年月日：令和8年9月2日

調査場所：たつの市揖保川町馬場

作型：きぬむすめ ← ※早期・普通期又は品種名を記載

調査基準(病害)

葉いもち病 A: 下葉は枯死し完全なスリコミ症状

B: かなり病斑がみられ軽いスリコミ症状を呈する

C: かなり見られる

D: 病斑がわずかに見られる

E: 病斑なし

穂いもち A: 穂首部が罹病し白穂になったもの又はこのためかなり不稔を起している

病害	A	B	C	D	E	(記入方法)
葉いもち病(25株)				1	24	右記の調査基準に基づき該当する株数を記入
穂いもち病(5株) ※5株の中の穂数を記入						
紋枯病(25株)					25	
縞葉枯病(25株)					25	
その他()					25	
特記事項						

D欄には5株の合計穂数を記入

穂いもち

虫害

すくいとり10回振	成虫	幼虫	種類名	合計
ヒメビウンカ	12	29		41
セジロウンカ	2			2
トビイロウンカ				0
ツマグロヨコバイ				0
すくいとり10回振	成虫	幼虫	種類名	合計
斑点米カメムシ類				0
払い落とし10株	成虫	幼虫		合計
ヒメビウンカ	2	7		9
セジロウンカ				0
トビイロウンカ				0
ツマグロヨコバイ				0
見取り(25株)	虫数/つと数	被害株数		発生株率
ニカメイガ(被害株数)				0.0
イネミスゾウムシ(虫数)				
イネツムシ(つと数)				
コブノメイガ(つと数)				
その他()				
特記事項				

B: 穂首部以外で一次枝梗以上が侵され枯死

紋枯病

A: 半数以上の茎が発病しほとんどが止葉から穂首まで侵され止葉が枯死の状態

B: 株の半数以上の茎が発病、病斑が止葉葉鞘まで達しているが止葉は生色ある

C: 株の半数以上の茎が発病し大部分の病斑が第二葉鞘まで達している

D: 病斑が第3葉鞘まで達している

E: 全く発病を認めない又は第4葉鞘以下の発病

縞葉枯病

A: 株のほとんどの茎が発病している

B: 株の2/3以上の茎が発病している

C: 株の1/3～2/3の茎が発病している

D: 株の1/3以下の茎が発病している

E: 発病が認められない

水稻病虫害発生予察調査報告野帳（標準様式）

調査年月日：令和8年9月2日

調査場所：たつの市御津町碓岩

作型：ヒノヒカリ

← ※早期・普通期又は品種名を記載

調査基準(病害)

葉いもち病 A: 下葉は枯死し完全なスリミ症状

B: かなり病斑がみられ軽いスリミ症状を呈する

C: かなり見られる

D: 病斑がわずかに見られる

E: 病斑なし

穂いもち

A: 穂首部が罹病し白穂になったもの又はこのためかなり不稔を起している

B: 穂首部以外で一次枝梗以上が侵され枯死

紋枯病

A: 半数以上の茎が発病しほとんどが止葉から穂首まで侵され止葉が枯死の状態

B: 株の半数以上の茎が発病、病斑が止葉葉鞘まで達しているが止葉は生色ある

C: 株の半数以上の茎が発病し大部分の病斑が第二葉鞘まで達している

D: 病斑が第3葉鞘まで達している

E: 全く発病を認めない又は第4葉鞘以下の発病

縞葉枯病

A: 株のほとんどの茎が発病している

B: 株の2/3以上の茎が発病している

C: 株の1/3～2/3の茎が発病している

D: 株の1/3以下の茎が発病している

E: 発病が認められない

病害	A	B	C	D	E	(記入方法)
葉いもち病(25株)					25	右記の調査基準に基づき該当する株数を記入
穂いもち病(5株) ※5株の中の穂数を記入						
紋枯病(25株)					25	
縞葉枯病(25株)					25	
その他()					25	
特記事項						

D欄には5株の合計穂数を記入

虫害

すくいとり10回振	成虫	幼虫	種類名	合計
ヒメビウンカ				0
セジロウンカ	2			2
トビイロウンカ				0
ツマグロヨコバイ				0
すくいとり10回振	成虫	幼虫	種類名	合計
斑点米カメムシ類				0
払い落とし10株	成虫	幼虫		合計
ヒメビウンカ	3			3
セジロウンカ	4			4
トビイロウンカ				0
ツマグロヨコバイ				0
見取り(25株)	虫数/つと数	被害株数		発生株率
ニカメイガ(被害株数)				0.0
イネミスゾウムシ(虫数)				
イネツトムシ(つと数)				
コブノメイガ(つと数)				
その他()				
特記事項				

水稻病虫害発生予察調査報告野帳（標準様式）

調査年月日：令和8年9月2日

調査場所：揖保郡太子町原

作型：コノホシ

← ※早期・普通期又は品種名を記載

調査基準(病害)

葉いもち病 A: 下葉は枯死し完全なスリミ症状

B: かなり病斑がみられ軽いスリミ症状を呈する

C: かなり見られる

D: 病斑がわずかに見られる

E: 病斑なし

穂いもち A: 穂首部が罹病し白穂になったもの又はこのためかなり不稔を起こしている

B: 穂首部以外で一次枝梗以上が侵され枯死

紋枯病 A: 半数以上の茎が発病しほとんどが止葉から穂首まで侵され止葉が枯死の状態

B: 株の半数以上の茎が発病、病斑が止葉葉鞘まで達しているが止葉は生色ある
C: 株の半数以上の茎が発病し大部分の病斑が第二葉鞘まで達している

D: 病斑が第3葉鞘まで達している

E: 全く発病を認めない又は第4葉鞘以下の発病

縞葉枯病 A: 株のほとんどの茎が発病している

B: 株の2/3以上の茎が発病している

C: 株の1/3～2/3の茎が発病している

D: 株の1/3以下の茎が発病している

E: 発病が認められない

病害	A	B	C	D	E	(記入方法)
葉いもち病(25株)					25	右記の調査基準に基づき該当する株数を記入
穂いもち病(5株) ※5株の中の穂数を記入						
紋枯病(25株)				1	24	
縞葉枯病(25株)					25	
その他()					25	
特記事項						

D欄には5株の合計穂数を記入

穂いもち

虫害

すくいとり10回振	成虫	幼虫	種類名	合計
ヒメビウンカ	12	13		25
セジロウンカ	6	13		19
トビイロウンカ				0
ツマグロヨコバイ				0
すくいとり10回振	成虫	幼虫	種類名	合計
斑点米カメムシ類	2			2
払い落とし10株	成虫	幼虫		合計
ヒメビウンカ	3	10		13
セジロウンカ	2	10		12
トビイロウンカ				0
ツマグロヨコバイ				0
見取り(25株)	虫数/つと数	被害株数		発生株率
ニカメイガ(被害株数)				0.0
イネミスゾウムシ(虫数)				
イネツトムシ(つと数)				
コブノメイガ(つと数)				
その他()				
特記事項				

水稻病虫害発生予察調査報告野帳（標準様式）

調査年月日：令和8年9月2日

調査場所：圏域内6圃場

作型：きぬむすめ・ヒノヒカリ ← ※早期・普通期又は品種名を記載

調査基準(病害)

葉いもち病 A: 下葉は枯死し完全なスリコミ症状

B: かなり病斑がみられ軽いスリコミ症状を呈する

C: かなり見られる

D: 病斑がわずかに見られる

E: 病斑なし

穂いもち A: 穂首部が罹病し白穂になったもの又はこのためかなり不稔を起している

B: 穂首部以外で一次枝梗以上が侵され枯死

紋枯病 A: 半数以上の茎が発病しほとんどが止葉から穂首まで侵され止葉が枯死の状態

B: 株の半数以上の茎が発病、病斑が止葉葉鞘まで達しているが止葉は生色ある
C: 株の半数以上の茎が発病し大部分の病斑が第二葉鞘まで達している

D: 病斑が第3葉鞘まで達している

E: 全く発病を認めない又は第4葉鞘以下の発病

縞葉枯病 A: 株のほとんどの茎が発病している

B: 株の2/3以上の茎が発病している

C: 株の1/3～2/3の茎が発病している

D: 株の1/3以下の茎が発病している

E: 発病が認められない

病害	A	B	C	D	E	(記入方法)
葉いもち病(25株)	0	0	0	15	135	右記の調査基準に基づき該当する株数を記入
穂いもち病(5株) ※5株の中の穂数を記入	0	0				
紋枯病(25株)	0	0	0	9	141	
縞葉枯病(25株)	0	0	0	0	150	
その他()	0	0	0	0	150	
特記事項	上記以外で被害のある病害について発生程度等を記載					

D欄には5株の合計穂数を記入

穂いもち

虫害

すくいとり10回振	成虫	幼虫	種類名	合計
ヒメビウンカ	25	86		111
セジロウンカ	77	13		90
トビイロウンカ	0	0		0
ツマゲロコバイ	7	6		13
すくいとり10回振	成虫	幼虫	種類名	合計
斑点米カメムシ類	3	0		3
払い落とし10株	成虫	幼虫		合計
ヒメビウンカ	10	35		45
セジロウンカ	7	11		18
トビイロウンカ	0	0		0
ツマゲロコバイ	0	3		3
見取り(25株)	虫数/つと数	被害株数		発生株率
ニカメイガ(被害株数)		0		0.0
イネミスゾウムシ(虫数)	0			
イネツムシ(つと数)	0			
コブノメイガ(つと数)	0			
その他()	0	0		
特記事項				