

果樹共済病害虫発生予察事業調査<野帳> (第1回)

調査日: 令和5年5月22日

地域名	地区名	病害(病斑/100枚)			虫害			果実の肥大状況(mm)											その他	
		黒斑病	クロホシ病	アカホシ病	ニセナシサビダニ (本/新梢100本)	ハダニ (匹/20枚)	アブラムシ (本/新梢100本)													
豊岡	金剛寺	20 / 100	0 / 100	0 / 100	0 / 100	0 / 20	0 / 100	31.0	29.0	30.0	34.0	30.0	30.0	30.0	29.0	29.0	31.0	平均 29.5		
		(20 %)	(0 %)	(0 %)	(0 %)	(0 匹)	(0 %)	27.0	28.0	29.0	29.0	29.0	29.0	27.0	30.0	28.0	30.0			
城崎	飯谷	18 / 100	0 / 100	2 / 100	0 / 100	3 / 20	0 / 100	23.0	25.0	26.0	27.0	25.0	23.0	24.0	26.0	23.0	25.0	平均 24.9		
		(18 %)	(0 %)	(2 %)	(0 %)	(0.2 匹)	(0 %)	26.0	24.0	27.0	28.0	24.0	26.0	23.0	24.0	23.0	26.0			
竹野	濱須井	2 / 100	0 / 100	0 / 100	0 / 100	0 / 20	3 / 100	29.0	25.0	26.0	28.0	26.0	26.0	30.0	28.0	32.0	26.0	平均 27.6		
		(2 %)	(0 %)	(0 %)	(0 %)	(0 匹)	(3.0 %)	27.0	24.0	26.0	28.0	25.0	28.0	29.0	29.0	31.0	29.0			
合 計		40 / 300	0 / 300	2 / 300	0 / 300	3 / 60	3 / 300												平均 27.3	
		(13.3 %)	(0 %)	(0.7 %)	(0 %)	(0.1 匹)	(1.0 %)													

天候: くもり