

令和6年度 丹波篠山黒豆定点生育調査(定点)

NO		1		福住(慣行) ◆条間		cm×株間		cm=栽植密度		#DIV/0!		本/10a		畝高		cm	
調査日	項目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	合計	平均	MAX	MIN
生育期 7/25	主茎長	33	35	30	30	29	25	25	25	32	37	30	36	367	30.5	37	25
	主茎節数	13	13	11	12	14	12	12	10	12	13	13	13	148	12.4	14	10
開花期 8/23	主茎長													0	0.0	0	0
	主茎節数													0	0.0	0	0
着莢期	着莢数													0	0.0	0	0

NO		2		畑井(慣行) ◆条間		cm×株間		cm=栽植密度		#DIV/0!		本/10a		畝高		cm	
調査日	項目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	合計	平均	MAX	MIN
生育期 7/25	主茎長	33	35	35	36	30	31	36	38	35	37	35	32	413	34.5	38	30
	主茎節数	12	12	12	12	10	12	12	10	11	11	12	11	137	11.5	12	10
開花期 8/23	主茎長													0	0.0	0	0
	主茎節数													0	0.0	0	0
着莢期	着莢数													0	0.0	0	0

NO		3		八上下(慣行) ◆条間		155.0 cm×株間		47 cm=栽植密度		1,373		本/10a		畝高		26.0 cm	
調査日	項目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	合計	平均	MAX	MIN
生育期 7/25	主茎長	49	42	51	44	48	52	50	50	51	55	52	49	593	49.6	55	42
	主茎節数	17	12	16	16	19	18	19	20	17	20	20	16	210	17.8	20	12
開花期 8/23	主茎長													0	0.0	0	0
	主茎節数													0	0.0	0	0
着莢期	着莢数													0	0.0	0	0

令和6年度 丹波篠山黒豆定点生育調査(定点)

NO		4		大野(慣行) ◆条間		cm×株間		cm=栽植密度		#DIV/0!		本/10a		畝高		cm	
調査日	項目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	合計	平均	MAX	MIN
生育期 7/25	主茎長	49	38	49	47	30	47	49	44	47	45	42	48	535	45.6	49	30
	主茎節数	14	11	14	14	12	14	15	14	13	12	12	14	159	13.3	15	11
開花期 8/21	主茎長													0	0.0	0	0
	主茎節数													0	0.0	0	0
着莢期	着莢数													0	0.0	0	0
NO		5		町ノ田(慣行) ◆条間		cm×株間		cm=栽植密度		#DIV/0!		本/10a		畝高		cm	
調査日	項目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	合計	平均	MAX	MIN
生育期 7/25	主茎長	35	33	35	40	36	34	36	34	34	35	36	37	425	35.2	40	33
	主茎節数	13	9	13	13	12	12	13	13	13	13	13	12	149	12.7	13	9
開花期 8/21	主茎長													0	0.0	0	0
	主茎節数													0	0.0	0	0
着莢期	着莢数													0	0.0	0	0
NO		6		上小野原(慣行) ◆条間		cm×株間		cm=栽植密度		#DIV/0!		本/10a		畝高		cm	
調査日	項目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	合計	平均	MAX	MIN
生育期 7/25	主茎長	40	50	48	35	44	45	39	42	39	40	33	45	500	41.7	50	33
	主茎節数	16	14	14	13	13	16	13	14	12	13	13	12	163	13.5	16	12
開花期 8/23	主茎長													0	0.0	0	0
	主茎節数													0	0.0	0	0
着莢期	着莢数													0	0.0	0	0