

令和6年度水稻定点調査 結果

丹波県民局丹波農業改良普及センター、丹波篠山市、JA丹波ささやま、兵庫県農業共済組合

設置場所	調査年度	移植日	移植時 葉齢	苗丈 (cm)	植付本数	草丈					茎数(本/株)					出穂日	穂長 (cm)	穂長 (cm)	穂数 (本/株)	精玄米重 (kg/10a)	千粒重 (g)
						6月1日期	6月14日期	7月1日期	7月16日期	7月31日期	6月1日期	6月14日期	7月1日期	7月16日期	7月31日期						
後川上 50.0株/坪	R6	5月3日				27.6	32.8	68.0	91.5	106.6	5.2	14.1	20.7	26.4	24.4	7月25日	81.7	17.2	22.2		
	平年比	-5				103.7%	92.3%	129.2%	116.7%	108.4%	68.0%	74.7%	82.2%	108.8%	105.2%	-5	94.1%	95.9%	100.2%		
	平年	5月8日	3.3	15.2	3.8	26.6	35.5	52.6	78.4	98.3	7.6	18.9	25.2	24.3	23.2	7月30日	86.8	17.9	22.2	502.6	21.8
般若寺 55.0株/坪	R6	5月4日				19.4	35.1	62.8	89.8	110.4	4.9	15.8	26.3	25.3	22.6	7月24日	88.1	21.9	21.4		
	平年比	-5				71.3%	92.1%	106.3%	108.8%	105.7%	50.0%	67.7%	92.2%	101.1%	95.4%	-4	101.1%	118.6%	90.0%		
	平年	5月8日	3.4	12.3	3.7	27.2	38.1	59.1	82.5	104.4	9.8	23.3	28.5	25.0	23.7	7月27日	87.1	18.5	23.8	472.9	21.5
本郷 62.9株/坪	R6	5月8日				25.7	32.4	67.0	81.2	94.5	9.8	19.7	23.4	19.1	18.8	7月26日	72.0	18.0	19.8		
	平年比	3				100.1%	97.8%	123.0%	102.8%	95.2%	133.3%	157.4%	116.2%	105.1%	104.2%	1	87.7%	98.0%	108.9%		
	平年	5月4日	3.5	17.0	4.1	25.7	33.1	54.5	79.0	99.2	7.4	12.5	20.1	18.2	18.1	7月25日	82.1	18.4	18.2	426.9	22.6
真南条下 56.4株/坪	R6	5月10日				27.3	34.7	58.4	80.5	100.9	7.1	18.9	21.3	15.0	19.8	7月26日	78.8	19.2	18.1		
	平年比	1				102.0%	89.0%	105.4%	104.0%	101.5%	67.7%	85.9%	82.9%	64.8%	96.8%	-1	96.0%	103.2%	90.5%		
	平年	5月8日	3.3	17.7	5.1	26.8	39.0	55.4	77.4	99.4	10.5	22.0	25.7	23.1	20.5	7月26日	82.1	18.6	20.0	398.2	22.3
町之田 61.1株/坪	R6	5月9日				24.9	31.5	64.2	85.2	102.0	6.4	15.9	18.4	17.6	19.2	7月25日	80.2	16.9	17.6		
	平年比	1				83.3%	84.5%	113.8%	108.7%	101.5%	63.1%	79.4%	75.9%	87.3%	100.4%	-2	94.3%	96.1%	91.4%		
	平年	5月8日	3.8	16.8	4.4	29.9	37.3	56.4	78.4	100.5	10.1	20.0	24.3	20.2	19.1	7月26日	85.0	17.6	19.3	450.3	21.7
川原 55.0株/坪	R6	5月15日				30.4	36.1	58.1	87.1	104.4	6.6	19.8	26.4	32.5	27.7	7月30日	80.8	17.9	25.1		
	平年比	3				129.5%	117.5%	111.6%	113.9%	109.0%	99.7%	148.7%	125.7%	164.9%	147.0%	0	97.9%	102.1%	130.7%		
	平年	5月11日	3.5	19.2	4.2	23.5	30.7	52.1	76.5	95.8	6.6	13.3	21.0	19.7	18.8	7月29日	82.6	17.5	19.2	467.8	22.0
上小野原 40.4株/坪	R6	5月19日				17.1	24.0	58.0	80.1	100.3	4.1	9.5	22.4	21.3	24.8	7月31日	84.1	17.1	21.6		
	平年比	4				68.0%	71.1%	108.1%	102.7%	101.3%	72.5%	62.1%	92.6%	96.7%	120.6%	1	98.4%	90.7%	105.3%		
	平年	5月14日	3.6	14.3	4.1	25.1	33.7	53.7	78.0	99.0	5.7	15.3	24.2	22.0	20.6	7月29日	85.5	18.9	20.5	475.0	21.9
令和6年平均		5月10日				24.6	32.4	62.4	85.1	102.7	6.3	16.2	22.7	22.5	22.5	7月26日	80.8	18.3	20.8		
対平年比		1				93.3%	91.6%	113.8%	108.2%	103.2%	76.4%	90.7%	94.0%	103.1%	109.3%	-1	95.7%	100.7%	101.9%		
平年		5月9日	3.5	16.3	4.2	26.4	35.4	54.8	78.6	99.5	8.2	17.9	24.1	21.8	20.6	7月28日	84.4	18.2	20.4	456.2	22.0

【8月29日調査 般若寺・真南条下・町之田・川原・上小野原 9月2日調査 後川上・本郷】

8月の気象は、平均気温が平年より1.1℃高く、日照時間も平年以上あり、降水量は少なかった。出穂後20日間の日平均気温が27℃を超える高温条件は、白未熟粒の発生を助長するが、本年8月1日～20日までの平均気温は27.5℃であり、本年の気象条件は等級などに悪影響を及ぼす可能性がある。

今回の調査では、穂長が80.8cmで平年と比べ95.7%とやや短く、穂長が18.3cmで平年と比べ100.7%と平年並、穂数が20.8本で101.9%と平年と比べやや多かった。倒伏程度は台風後の調査圃場で問題なかった。病虫害については、圃場によってもち病やイネカメムシの発生が多く見られた。

次回、10月11日の収量調査を持って、本年の定点生育調査を終了します。

