令和7年度 丹波篠山黒豆定点病害虫調査表

NO	1	福	住																			
調			病	害										虫	害							
査	ウイルス病	さび病	べと病	葉焼病	その他	立枯病		ンヨトウ	フキノ	′メイガ	サヤュ	ムシガ	カメム	ゝシ類	鱗翅[目幼虫	フタスシ゛	ヒメハムシ	その	D他	ハダニ	アブラムシ
株	株20	株20	株20	株20	株20			被害株数	20株虫数	被害株数	20株虫数	被害株数	小葉50	小葉50								
合計																						
発生率•平均	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00

NO	2	畑	井																			
調			病	害										虫	害							
査	ウイルス病	さび病	べと病	葉焼病	その他	立枯病	ハスモ	ンヨトウ	フキノ	'メイガ	サヤ	ムシガ	カメノ	シ類	鱗翅目	目幼虫	フタスシ゛	こメハムシ	その	D他	ハダニ	アブラムシ
株	株20	株20	株20	株20	株20		20株虫数	被害株数	20株虫数	被害株数	小葉50	小葉50										
合計													3									
発生率・平均	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.15	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0

NO	3	口以	瓦本																			
調			病	害										虫	害							
査	ウイルス病	さび病	べと病	葉焼病	その他	立枯病		ンヨトウ	フキノ	'メイガ	サヤ	ムシガ	カメム	ゝシ類	鱗翅目	1幼虫	フタスシ゛	ヒメハムシ	そ0	D他	ハダニ	アブラムシ
株	株20	株20	株20	株20	株20			被害株数	20株虫数	被害株数	20株虫数	被害株数	小葉50	小葉50								
合計				12																		
発生率·平均	0	0	0	60	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00

NO	4	町ノ	/田																			
調			病	害										虫	害							
査	ウイルス病	さび病	べと病	葉焼病	その他	立枯病	ハスモ	ンヨトウ	フキノ	′メイガ	サヤュ	ムシガ	カメム	シ類	鱗翅目	目幼虫	フタスシ゛	ヒメハムシ	その	の他	ハダニ	アブラムシ
株	株20	株20	株20	株20	株20		20株虫数	被害株数	20株虫数	被害株数	小葉50	小葉50										
合計				19				2										5				
発生率・平均	0	0	0	95	0	0	0.00	10	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	25	0.00	0	0.00	0.00

令和7年度 丹波篠山黒豆定点病害虫調査表

NO	5	人人	上下																			
調			病	害										虫	害							
査	ウイルス病	さび病	べと病	葉焼病	その他	立枯病		ンヨトウ	フキノ	メイガ	サヤュ	ムシガ	カメノ	ゝシ類	鱗翅[目幼虫	フタスシ゛	ヒメハムシ	その	D他	ハダニ	アブラムシ
株	株20	株20	株20	株20	株20			被害株数	20株虫数	被害株数	20株虫数	被害株数	小葉50	小葉50								
合計			3			6												4				
発生率・平均	0	0	15	0	0	12	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	20	0.00	0	0.00	0.00

NO	6	上小	野原																			
調			病	害										虫	害							
査	ウイルス病	さび病	べと病	葉焼病	その他	立枯病	ハスモ	ンヨトウ	フキノ	'メイガ	サヤ	ムシガ	カメム	シ類	鱗翅目	目幼虫	フタスシ゛	ヒメハムシ	その)他	ハダニ	アブラムシ
株	株20	株20	株20	株20	株20		20株虫数	被害株数	20株虫数	被害株数	小葉50	小葉50										
合計				10						1							1		1			
発生率·平均	0	0	0	50	0	0	0.00	0	0.00	5	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.05	0	0.05	0	0.00	0.00

令和7年度 丹波篠山黒豆定点病害虫調査表

調			病	害										虫	害							
調査地点	ウイルス病	さび病	べと病	葉焼病	その他	立枯病	ハスモ	ンヨトウ	フキノ	/メイガ	サヤ.	ムシガ	カメム	シ類	鱗翅目	目幼虫	フタスシ゛	ヒメハムシ	そ(の他	ハダニ (頭/	アブラ ムシ
点	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	虫数/株	被害株率	虫数/株	被害株率	虫数/株	被害株率	小井)	(頭/ 小葉)								
福住	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
畑井	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.15	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
口阪本	0	0	0	60	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
町ノ田	0	0	0	95	0	0	0.00	10	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	25	0.00	0	0.00	0.00
八上下	0	0	15	0	0	12	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	20	0.00	0	0.00	0.00
上小野原	0	0	0	50	0	0	0.00	0	0.00	5	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.05	0	0.05	0	0.00	0.00
平均	0.00	0.00	2.50	34.17	0.00	2.00	0.00	1.67	0.00	0.83	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.01	7.50	0.01	0.00	0.00	0.00