

令和7年度水稻定点調査 結果

丹波県民局丹波農業改良普及センター、丹波篠山市、JA丹波ささやま、兵庫県農業共済組合

設置場所	調査年度	移植日	移植時 葉齢	苗丈 (cm)	植付本数	草丈					茎数(本／株)					出穂日	稈長 (cm)	穂長 (cm)	穂数 (本/株)	精玄米重 (kg/10a)	千粒重 (g)
						6月1日期	6月15日期	7月1日期	7月15日期	7月31日期	6月1日期	6月15日期	7月1日期	7月15日期	7月31日期						
後川上 46.0株/坪	R7	5月3日			5.4	31.7	37.2	64.6	92.5	109.5	11.7	17.7	15.7	19.5	23.2	7月25日					
	平年比	-4			140.7%	119.6%	106.3%	118.7%	116.8%	110.8%	160.4%	99.7%	64.6%	80.5%	101.3%	-4					
	平年	5月6日	3.3	15.2	3.8	26.5	35.0	54.4	79.2	98.8	7.3	17.7	24.3	24.2	22.9	7月29日	80.5	18.8	20.4	517.3	23.4
般若寺 47.8株/坪	R7	5月4日			3.6	30.4	39.9	64.9	92.5	108.3	5.8	11.5	21.0	15.9	17.1	7月20日					
	平年比	-4			96.1%	113.7%	106.6%	109.5%	111.9%	103.5%	62.1%	50.6%	74.9%	64.2%	73.2%	-7					
	平年	5月7日	3.4	12.3	3.7	26.7	37.4	59.3	82.7	104.7	9.3	22.7	28.1	24.8	23.3	7月27日	85.0	18.5	19.5	473.0	21.8
本郷 56.4株/坪	R7	5月10日			4.0	30.1	36.1	70.5	97.1	110.1	8.5	16.3	26.0	26.7	25.7	7月22日					
	平年比	+5			97.2%	115.8%	108.8%	125.7%	122.0%	110.9%	109.4%	120.4%	125.1%	145.4%	141.0%	-3					
	平年	5月5日	3.5	17.0	4.1	26.0	33.2	56.1	79.6	99.3	7.8	13.5	20.8	18.4	18.2	7月25日	81.5	18.3	18.5	432.4	22.5
真南条中 44.0株/坪	R7	5月21日				22.3	32.5	61.3	84.9	106.0	5.3	12.1	34.0	34.5	37.4	8月1日					
	平年比	+13				81.7%	83.8%	109.0%	108.7%	106.0%	50.3%	53.6%	129.1%	148.4%	178.4%	7					
	平年	5月8日	3.3	17.7	5.1	27.3	38.8	56.2	78.1	100.0	10.5	22.6	26.3	23.3	21.0	7月25日	82.1	18.5	20.2	389.5	22.3
町之田 45.8株/坪	R7	5月5日			4.8	30.5	41.3	69.2	90.5	106.4	10.7	18.0	22.5	19.0	19.8	7月21日					
	平年比	-2			108.2%	103.8%	112.0%	121.3%	114.3%	105.2%	104.6%	89.3%	94.4%	95.6%	102.8%	-4					
	平年	5月7日	3.8	16.8	4.4	29.4	36.9	57.1	79.2	101.1	10.2	20.2	23.8	19.9	19.3	7月25日	85.2	17.4	19.3	439.7	21.7
川原 48.1株/坪	R7	4月28日			6.0	23.2	41.9	57.5	90.1	102.7	9.3	17.6	18.7	15.7	19.3	7月25日					
	平年比	-13			143.1%	93.7%	132.6%	110.9%	115.5%	105.3%	138.3%	123.9%	87.1%	73.9%	95.9%	-4					
	平年	5月11日	3.5	19.2	4.2	24.8	31.6	51.8	78.0	97.6	6.7	14.2	21.5	21.3	20.1	7月29日	81.7	17.7	19.4	450.0	22.0
上小野原 39.3株/坪	R7	5月19日			3.8	23.6	30.5	62.0	85.5	99.7	3.7	6.9	18.8	24.4	25.2	7月29日					
	平年比	+3			93.4%	95.3%	96.5%	119.6%	109.6%	102.2%	68.2%	47.1%	77.5%	109.0%	118.3%	+1					
	平年	5月15日	3.6	14.3	4.1	24.8	31.6	51.8	78.0	97.6	5.4	14.6	24.3	22.4	21.3	7月28日	82.1	19.0	20.3	410.9	21.8
令和7年平均		5月9日			4.6	27.4	37.1	64.3	90.4	106.1	7.9	14.3	22.4	22.2	24.0	7月25日					
対平年比		±0			109.3%	103.4%	106.1%	116.4%	114.1%	106.2%	96.0%	79.7%	92.7%	101.0%	114.8%	-2					
平年		5月9日	3.5	16.3	4.2	26.5	34.9	55.2	79.2	99.9	8.2	17.9	24.2	22.0	20.9	7月27日	82.6	18.3	19.6	444.7	22.2

【7月30日調査】
7月30日の調査では、ほ場間のばらつきが見られたが、全体平均で草丈は106.1cmで平年と比べ106.2%と平年より高くなった。また、株当たりの茎数は24.0本/株で平年と比べ114.8%と平年より多くなった。7月の気温が6月に引き続き平年より高く推移したことが原因と考えられる。定点における出穂期は平年より平均2日早まった。
病害虫については、斑点カメムシ類の発生が引き続き確認されており、穂揃い期から乳熟期まで対策を行う必要がある。いもち病、ウンカ類等については、大きな問題は見られなかった。
今後の管理について、穂揃い期から水管理は飽水管理(足形に水が溜まっている程度)とし、早期落水は避ける。斑点米カメムシ類の発生が多い場合は防除を実施する。