

令和7年度水稻定点調査 結果

丹波県民局丹波農業改良普及センター、丹波篠山市、JA丹波ささやま、兵庫県農業共済組合

設置場所	調査年度	移植日	移植時 葉齢	苗丈 (cm)	植付本数	草丈					茎数(本／株)					出穂日	稈長 (cm)	穂長 (cm)	穂数 (本/株)	精玄米重 (kg/10a)	千粒重 (g)
						6月1日期	6月15日期	7月1日期	7月15日期	7月31日期	6月1日期	6月15日期	7月1日期	7月15日期	7月31日期						
後川上 46.0株/坪	R7	5月3日			5.4	31.7					11.7										
	平年比	-4			140.7%	119.6%					160.4%										
	平年	5月6日	3.3	15.2	3.8	26.5	35.0	54.4	79.2	98.8	7.3	17.7	24.3	24.2	22.9	7月29日	80.5	18.8	20.4	517.3	23.4
般若寺 47.8株/坪	R7	5月4日			3.6	30.4					5.8										
	平年比	-4			96.1%	113.7%					62.1%										
	平年	5月7日	3.4	12.3	3.7	26.7	37.4	59.3	82.7	104.7	9.3	22.7	28.1	24.8	23.3	7月27日	85.0	18.5	19.5	473.0	21.8
本郷 56.4株/坪	R7	5月10日			4.0	30.1					8.5										
	平年比	+5			97.2%	115.8%					109.4%										
	平年	5月5日	3.5	17.0	4.1	26.0	33.2	56.1	79.6	99.3	7.8	13.5	20.8	18.4	18.2	7月25日	81.5	18.3	18.5	432.4	22.5
真南条中 44.0株/坪	R7	5月21日				22.3					5.3										
	平年比	+13				81.7%					50.3%										
	平年	5月8日	3.3	17.7	5.1	27.3	38.8	56.2	78.1	100.0	10.5	22.6	26.3	23.3	21.0	7月25日	82.1	18.5	20.2	389.5	22.3
町之田 45.8株/坪	R7	5月5日			4.8	30.5					10.7										
	平年比	-2			108.2%	103.8%					104.6%										
	平年	5月7日	3.8	16.8	4.4	29.4	36.9	57.1	79.2	101.1	10.2	20.2	23.8	19.9	19.3	7月25日	85.2	17.4	19.3	439.7	21.7
川原 48.1株/坪	R7	4月28日			6.0	23.2					9.3										
	平年比	-13			143.1%	93.7%					138.3%										
	平年	5月11日	3.5	19.2	4.2	24.8	31.6	51.8	78.0	97.6	6.7	14.2	21.5	21.3	20.1	7月29日	81.7	17.7	19.4	450.0	22.0
上小野原 39.3株/坪	R7	5月19日			3.8	23.6					3.7										
	平年比	+3			93.4%	95.3%					68.2%										
	平年	5月15日	3.6	14.3	4.1	24.8	31.6	51.8	78.0	97.6	5.4	14.6	24.3	22.4	21.3	7月28日	82.1	19.0	20.3	410.9	21.8
令和7年平均		5月9日			4.6	27.4					7.9										
対平年比		±0			109.3%	103.4%					96.0%										
平年		5月9日	3.5	16.3	4.2	26.5	34.9	55.2	79.2	99.9	8.2	17.9	24.2	22.0	20.9	7月27日	82.6	18.3	19.6	444.7	22.2

【6月2日調査】
6月2日の調査では、ほ場間のばらつきが見られたが、全体平均で草丈は27.4cmで平年(26.5cm)と比べ103.4%と平年よりやや高くなった。また、株当たりの茎数は7.9本で平年(8.2本)と比べ96.0%と平年よりやや少なかった。この原因は、5月の日照時間は170.8hと平年(197.6h)より少なく、平均気温は17.5℃と平年並み(17.5℃)であったことが考えられる。
病害虫については、大きな問題は見られなかった。
今後は浅水管理を行い分けつを促進し、目標茎数(16～20本)を確保次第、中干しを行う。