

令和8年度水稻定点調査 結果 丹波県民局丹波農業改良普及センター、丹波篠山市、JA丹波ささやま、兵庫県農業共済組合

設置場所	調査年度	移植日	草丈					茎数(本/株)					出穂日	稈長 (cm)	穂長 (cm)	穂数 (本/株)	精玄米重 (kg/10a)	千粒重 (g)
			6月1日期	6月15日期	7月1日期	7月15日期	7月31日期	6月1日期	6月15日期	7月1日期	7月15日期	7月31日期						
後川上 47.6株/坪	R8	5月3日	27.9	41.6	61.9	83.2	100.4	11.1	16.6	21.5	23.7	21.3	7月27日	86.6	18.3	21.5		
	平年比	-4	103%	118%	111%	102%	100%	143%	97%	95%	103%	94%	-1	101%	102%	100%		
	平年	5月7日	27.0	35.2	55.8	81.2	100.6	7.8	17.2	22.8	23.0	22.7	7月28日	85.9	17.9	21.4	482.9	21.7
般若寺 62.9株/坪	R8	5月20日	24.6	37.0	56.5	75.0	94.6	4.5	12.2	25.3	23.5	21.0	7月31日	91.7	19.3	20.7		
	平年比	+13	90%	98%	94%	89%	90%	51%	59%	95%	102%	93%	+5	106%	104%	93%		
	平年	5月7日	27.3	37.9	59.9	84.3	105.1	8.8	20.8	26.8	23.1	22.5	7月26日	86.4	18.5	22.2	465.7	21.5
本郷 43.1株/坪	R8	5月3日	28.8	46.6	63.7	82.3	104.7	9.7	14.8	27.4	23.1	27.4	7月22日	82.6	21.6	26.1		
	平年比	-1	108%	137%	109%	100%	103%	120%	106%	127%	120%	144%	-1	101%	116%	136%		
	平年	5月4日	26.6	34.1	58.6	82.6	101.3	8.1	13.9	21.5	19.2	19.1	7月24日	81.7	18.6	19.1	438.4	22.2
真南条中 36.7株/坪	R8	5月23日	28.6	39.9	61.6	81.0	102.3	4.8	10.5	26.1	28.9	27.4	7月30日	92.4	20.5	29.2		
	平年比	+14	107%	104%	108%	102%	101%	47%	49%	99%	121%	124%	+5	113%	109%	137%		
	平年	5月9日	26.8	38.2	56.8	79.2	101.2	10.2	21.3	26.3	23.8	22.2	7月25日	81.9	18.8	21.3	391.9	22.3
町ノ田 59.5株/坪	R8	5月6日	33.9	51.6	62.2	80.9	102.4	12.3	22.0	24.6	24.1	17.9	7月22日	83.5	19.8	25.1		
	平年比	-2	114%	138%	106%	100%	99%	127%	110%	102%	120%	91%	-3	97%	112%	128%		
	平年	5月8日	29.8	37.4	58.8	81.1	103.0	9.7	20.1	24.1	20.1	19.6	7月25日	86.1	17.7	19.6	453.0	21.9
川原 53.0株/坪	R8	4月24日	30.1	47.8	70.1	88.8	108.1	17.6	17.0	20.8	23.3	25.0	7月21日	89.1	19.7	24.8		
	平年比	-17	120%	145%	133%	111%	109%	260%	123%	103%	115%	126%	-7	111%	107%	132%		
	平年	5月11日	25.2	32.9	52.8	80.2	99.3	6.8	13.8	20.1	20.3	19.8	7月28日	80.2	18.4	18.7	429.1	21.8
上小野原 57.9株/坪	R8	5月16日	25.5	31.0	64.0	77.4	96.3	8.9	14.6	27.6	23.3	20.4	7月27日	88.5	20.2	22.1		
	平年比	0	106%	97%	117%	98%	97%	187%	112%	120%	105%	95%	-1	109%	108%	109%		
	平年	5月16日	24.1	31.8	54.9	78.9	99.2	4.8	13.0	23.1	22.2	21.4	7月28日	81.2	18.6	20.4	381.0	21.7
令和8年平均		5月9日	28.5	42.2	62.9	81.2	101.3	9.8	15.4	24.8	24.3	22.9	7月25日	87.8	19.9	24.2		
対平年比		±0	107%	119%	111%	100%	100%	123%	90%	105%	112%	109%	-1	105%	108%	119%		
平年		5月9日	26.7	35.4	56.8	81.1	101.4	8.0	17.2	23.5	21.7	21.0	7月26日	83.3	18.4	20.4	434.6	21.9

【9月3日調査】

8月の気象は、平均気温が27.1℃で平年(26.7℃)より0.4℃高かった。定点の平均出穂日7月25日から20日間の日平均気温が27.4℃で、白未熟粒の発生を助長する27℃を超えており、本年の気象条件は等級などに影響を及ぼす可能性がある。

今回の調査では、稈長が87.8cmで平年と比べ105%と平年よりやや高く、穂長が19.9cmで平年と比べ108%とやや長く、穂数が24.2本で119%と平年と比べ多かった。収穫期調査時点ではほとんど倒伏が見られなかったものの、9月以降の収穫期の長雨により、収穫作業が遅れており、倒伏等が懸念される。

次回、10月9日の収量調査を持って、本年の定点生育調査を終了します。