

丹波市水稻生育調査結果

調査日：

平年値集計表

年度	田植日	草丈(cm)				分けつ(本)				出穂日 (推測)	成熟日 (推測)	成熟日 (坪刈日)	稈長 (cm)	穂長 (cm)	全長 (cm)	穂数 (本)	穂数 (実刈・㎡)	備考
		6月中旬	6月下旬	7月下旬	8月上旬	6月中旬	6月下旬	7月下旬	8月上旬									
16年度	—	45.6	61.1	—	—	22.6	—	—	—	—	—	9/11	—	—	—	—	—	—
17年度	5/4	39.7	71.2	87.1	—	25.6	29.8	24.6	—	7/23	—	—	91.0	18.6	109.6	25.3	—	—
18年度	5/15	37.8	63.6	78.7	—	13.6	21.0	20.6	—	8/1	—	9/7	87.6	17.5	105.1	19.7	—	—
19年度	5/16	36.9	66.4	77.1	—	14.9	21.8	21.2	—	8/6	—	—	85.8	17.4	103.2	19.3	—	—
20年度	—	38.9	57.0	74.7	—	15.0	21.3	21.0	—	8/6	—	—	85.8	17.4	103.2	19.3	—	—
21年度	5/12	32.2	59.0	79.1	—	12.8	21.8	22.7	—	—	—	8/31	96.8	18.3	115.1	20.5	—	—
22年度	—	26.4	50.0	80.8	—	13.3	17.2	18.9	—	—	—	8/31	85.0	19.4	104.4	19.2	—	—
23年度	5/12	33.3	—	84.0	—	16.6	—	25.1	—	—	—	8/31	—	—	—	—	—	—
24年度	5/8	34.1	55.2	—	106.4	14.4	23.7	—	21.8	7/28	—	8/31	85.6	18.8	104.3	20.6	—	—
25年度	5/10	42.3	60.8	95.9	—	18.3	21.9	22.8	—	7/28	—	8/30	89.3	17.8	107.1	21.3	—	—
26年度	5/8	37.4	53.8	91.9	—	14.9	27.8	22.0	—	7/27	—	—	87.7	18.4	106.1	20.0	—	—
27年度	5/12	29.8	46.4	86.3	—	10.6	21.5	23.8	—	7/30	—	9/3	85.2	18.2	103.3	22.6	—	49.3
28年度	5/11	31.7	53.6	97.4	—	11.9	20.1	20.9	—	7/28	—	9/1	86.5	18.5	104.9	19.8	—	50.2
29年度	5/9	28.7	37.9	96.1	—	12.6	21.2	23.2	—	7/26	—	8/30	83.6	19.0	102.6	23.2	—	45.0
30年度	5/6	40.8	55.1	95.6	—	16.5	25.2	21.2	—	7/21	—	8/27	82.5	20.1	102.7	20.4	—	49.0
元年度	5/7	38.5	52.6	91.8	—	19.9	30.4	22.9	—	7/29	9/1	8/28	86.0	18.1	104.1	22.9	301.5	—
2年度	5/7	46.9	63.9	97.9	—	17.6	24.2	21.2	—	7/25	—	8/27	87.0	17.5	104.5	19.8	298.4	—
3年度	5/10	39.5	59.0	100.8	—	19.2	26.8	23.5	—	7/27	9/1	8/31	89.2	18.3	107.5	22.5	324.1	—
4年度	5/6	35.1	63.7	103.5	—	17.7	25.7	25.7	—	7/28	—	8/31	89.8	15.4	105.2	25.2	413.7	—
5年度	5/6	37.9	58.7	102.2	—	18.7	24.8	21.8	—	—	—	—	86.0	17.6	103.7	21.6	303.5	—
6年度	—	32.9	59.4	102.9	—	16.6	25.1	23.7	—	—	—	—	88.5	16.6	106.7	23.1	320.0	—
7年度	—	41.1	69.9	103.5	—	17.2	24.9	22.1	—	—	—	—	85.3	18.3	103.7	22.2	325.3	—
8年度	5/7	44.4	61.7	102.7	—	17.7	25.8	22.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
平年値	5/9	37.0	58.2	91.9	—	16.4	23.9	22.5	—	7/28	—	8/31	87.2	18.1	105.4	21.4	—	—

令和8年度丹波市定点生育調査集計値

調査地点	田植日	草丈(cm)				分けつ(本)				出穂日 (推測)	成熟日 (推測)	成熟日 (坪刈日)	稈長 (cm)	穂長 (cm)	全長 (cm)	穂数 (株)	穂数 (実刈・㎡)	備考
		6/16	6/30	7/28	—	6/16	6/30	7/28	—									
1 柏原 拳田	5/14	42.8	59.4	96.7	—	18.5	27.2	19.5	—	—	—	8/25	—	0.0	—	—	—	夢たんば
2 柏原 下小倉	5/15	33.1	51.8	100.3	—	11.4	19.9	22.5	—	—	—	8/25	—	0.0	—	—	—	一般コシヒカリ
3 山南 北和田	5/6	46.8	76.0	110.8	—	21.7	30.9	25.8	—	—	—	8/25	—	0.0	—	—	—	夢たんば
4 山南 奥野々	5/23	32.5	57.0	94.9	—	9.1	23.0	20.8	—	—	—	8/25	—	0.0	—	—	—	一般コシヒカリ
5 氷上 南油良	5/6	35.1	59.2	94.9	—	11.0	17.2	16.1	—	—	—	8/25	—	0.0	—	—	—	夢たんば
6 氷上 小野	5/3	52.3	63.0	109.3	—	21.6	34.5	29.3	—	—	—	8/25	—	0.0	—	—	—	一般コシヒカリ
7 青垣 沢野	5/6	50.2	54.7	95.5	—	24.0	26.0	20.8	—	—	—	8/25	—	0.0	—	—	—	夢たんば
8 青垣 東芦田	5/10	44.4	59.0	101.9	—	22.2	25.3	19.8	—	—	—	8/25	—	0.0	—	—	—	一般コシヒカリ
9 市島 上竹田	5/9	43.1	56.3	99.3	—	16.1	24.6	23.6	—	—	—	8/25	—	0.0	—	—	—	一般コシヒカリ
10 市島 乙河内	4/26	50.7	70.5	105.4	—	16.0	24.1	24.3	—	—	—	8/25	—	—	—	—	—	夢たんば
11 春日 多利	5/5	51.5	66.7	106.0	—	21.6	26.7	22.1	—	—	—	8/25	—	—	—	—	—	一般コシヒカリ
12 春日 稲塚	5/1	51.2	67.8	117.8	—	19.4	30.3	29.8	—	—	—	8/25	—	—	—	—	—	夢たんば
平均値	5/7	44.4	61.7	102.7	—	17.7	25.8	22.8	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—
平年値比%	—	120.0	106.1	111.7	—	107.6	107.8	101.7	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—
前年対比%	—	135.0	103.9	99.8	—	106.7	102.7	96.4	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—

2026年度 水稻生育・収量調査野帳

設置場所	柏原町拳田	面積	27.4	前作
担当農家		品種	夢たんば	区 設定
耕種概要	播 種 / 代かき / 田植え 5月14日			

項目	草丈 (cm)				分けつ (本)				収穫期調査日： 8/25 (実坪刈実施日： 8/25) 条間： 株間：					
	①	②	③	④	①	②	③	④	稈長	穂長	全長	穂数	生葉数	平均穂数 代表株
月日	6/16	6/30	7/28	/	6/16	6/30	7/28	/						
1	44.0	58.0	97.0		14	25	18			0				
2	45.0	58.0	98.0		27	32	24			0				
3	40.0	59.0	96.0		22	29	17			0				
4	42.0	59.0	94.0		29	35	22			0				
5	42.0	57.0	99.0		32	40	28			0				
6	43.0	61.0	98.0		16	29	17			0				
7	43.0	64.0	100.0		7	19	16			0				
8	45.0	62.0	97.0		14	16	15			0				
9	42.5	61.0	98.0		14	25	17			0				
10	37.0	60.0	90.0		17	15	14			0				
11	40.5	58.0	97.0		22	28	21			0				
12	45.0	59.0	97.0		13	31	19			0				
13	43.0	61.0	98.0		13	21	15			0				
14	44.0	64.0	100.0		13	24	18			0				
15	45.0	60.0	94.0		10	13	17			0				
16	46.0	59.0	93.0		21	33	24			0				
17	40.0	55.0	96.0		19	25	19			0				
18	45.0	58.0	95.0		15	25	17			0				
19	40.0	57.0	100.0		18	35	25			0				
20	43.0	57.0	97.0		34	43	27			0				
平均	42.8	59.4	96.7		18.5	27.2	19.5			0.0				

葉色	/		/		/	
----	---	--	---	--	---	--

坪刈株数	
------	--

月/日	項目	/	/	/	/
いもち病	数				
	程度				
紋 枯 病	数				
	程度				
	数				
	程度				
	数				
	程度				

月/日	項目	/	/	/	/
	ヒメトビウンカ	匹			
	セジロウンカ	匹			
	トビイロウンカ	匹			
	ツマグロヨコバイ	匹			
	カメムシ類	匹			
		匹			
		匹			
		匹			

※病害数は25株中の発病株数を記入。病害程度は株全体から甚（100～76）・多（75～51）・中（50～26）・少（25～1）・無（0%）で判断。

※害虫は、すくい取り10回振り（ウンカ類）・20回振り（カメムシ類）の成虫・幼虫数計を記入。

備考：※ 雑草、水管理、土質、還元状態や肥料・農薬等耕種概要など特記事項を記入

--

2026年度 水稻生育・収量調査野帳

設置場所	柏原町下小倉	面積	15.4	前作
担当農家		品種	一般 コシヒカリ	区 設定
耕種概要	播 種 / 代かき / 田植え 5月15日			

項目	草丈 (cm)				分けつ (本)				収穫期調査日： 8/25 (実坪刈実施日： 8/25) 条間： 株間：					
	①	②	③	④	①	②	③	④	稈長	穂長	全長	穂数	生葉数	平均穂数 代表株
月日	6/16	6/30	7/28	/	6/16	6/30	7/28	/						
1	34.0	57.0	98		15	20	28			0				
2	31.0	50.0	100		7	18	21			0				
3	35.0	53.0	102		9	21	23			0				
4	34.0	53.0	96		7	21	21			0				
5	33.0	50.0	103		9	19	20			0				
6	35.0	55.0	107		9	18	21			0				
7	33.0	51.0	97		8	17	20			0				
8	33.0	50.0	98		8	21	25			0				
9	32.0	52.0	100		9	20	24			0				
10	33.0	53.0	106		9	20	22			0				
11	30.0	50.0	96		5	13	15			0				
12	32.0	54.0	101		9	19	24			0				
13	34.0	48.0	100		8	17	20			0				
14	32.0	49.0	103		4	9	15			0				
15	35.0	52.0	102		15	28	29			0				
16	32.0	51.0	97		12	15	16			0				
17	33.0	54.0	101		24	27	27			0				
18	32.0	54.0	102		23	25	25			0				
19	33.0	49.0	98		19	27	26			0				
20	35.0	50.0	99		18	23	27			0				
平均	33.1	51.8	100.3		11.4	19.9	22.5			0.0				

葉色	/	/	/	/
----	---	---	---	---

坪刈株数	
------	--

月/日	項目	/	/	/	/
いもち病	数				
	程度				
紋 枯 病	数				
	程度				
	数				
	程度				
	数				
	程度				

月/日	項目	/	/	/	/
	ヒメトビウンカ	匹			
	セジロウンカ	匹			
	トビイロウンカ	匹			
	ツマグロヨコバイ	匹			
	カメムシ類	匹			
		匹			
		匹			
		匹			

※病害数は25株中の発病株数を記入。病害程度は株全体から甚（100～76）・多（75～51）・中（50～26）・少（25～1）・無（0%）で判断。

※害虫は、すくい取り10回振り（ウンカ類）・20回振り（カメムシ類）の成虫・幼虫数計を記入。

備考：※ 雑草、水管理、土質、還元状態や肥料・農薬等耕種概要など特記事項を記入

--

2026年度 水稻生育・収量調査野帳

設置場所	山南町梶	面積	13.6	前作
担当農家		品種	夢たんば	区設定
耕種概要	播 種 / 代かき / 田植え	5月6日		

項目	草丈 (cm)				分けつ (本)				収穫期調査日 : 8/25 (実坪刈実施日 : 8/25) 条間 : 株間 :					
	①	②	③	④	①	②	③	④	稈長	穂長	全長	穂数	生葉数	平均穂数 代表株
月日	6/16	6/30	7/28	/	6/16	6/30	7/28	/						
1	44.0	77.0	107		10	15	12			0				
2	50.0	80.0	113		33	37	28			0				
3	51.0	77.0	112		23	31	24			0				
4	47.0	79.0	116		41	41	35			0				
5	50.0	79.0	114		24	26	22			0				
6	46.0	79.0	112		17	24	22			0				
7	45.0	74.0	112		19	31	23			0				
8	49.0	80.0	112		23	36	27			0				
9	51.0	77.0	117		16	35	26			0				
10	48.0	76.0	111		20	33	27			0				
11	40.0	76.0	116		19	27	25			0				
12	46.0	75.0	108		24	32	34			0				
13	41.0	73.0	105		16	20	21			0				
14	50.0	75.0	108		23	33	30			0				
15	49.0	77.0	107		19	26	23			0				
16	48.0	73.0	112		24	31	28			0				
17	44.0	76.0	106		21	39	32			0				
18	46.0	74.0	109		20	31	22			0				
19	43.0	70.0	108		19	31	24			0				
20	48.0	72.0	110		23	38	30			0				
平均	46.8	76.0	110.8		21.7	30.9	25.8			0.0				

葉色	/	/	/	/
----	---	---	---	---

坪刈株数	
------	--

月/日	項目	/	/	/	/
いもち病	数				
	程度				
紋 枯 病	数				
	程度				
	数				
	程度				
	数				
	程度				

月/日	項目	/	/	/	/
	ヒメトビウンカ	匹			
	セジロウンカ	匹			
	トビイロウンカ	匹			
	ツマグロヨコバイ	匹			
	カメムシ類	匹			
		匹			
		匹			
		匹			

※病害数は25株中の発病株数を記入。病害程度は株全体から甚（100～76）・多（75～51）・中（50～26）・少（25～1）・無（0%）で判断。

※害虫は、すくい取り10回振り（ウンカ類）・20回振り（カメムシ類）の成虫・幼虫数計を記入。

備考：※ 雑草、水管理、土質、還元状態や肥料・農薬等耕種概要など特記事項を記入

--

2026年度 水稻生育・収量調査野帳

設置場所	山南町奥野々	面積	12.3	前作
担当農家		品種	一般コシヒカリ	区 設定
耕種概要	播 種 / 代かき / 田植え	5月23日		

項目	草丈 (cm)				分けつ (本)				収穫期調査日 : 8/25 (実坪刈実施日 : 8/25) 条間 : 株間 :					
	①	②	③	④	①	②	③	④						
月日	6/16	6/30	7/28	/	6/16	6/30	7/28	/	稈長	穂長	全長	穂数	生葉数	平均穂数 代表株
1	32.0	54.0	89		6	21	20			0				
2	36.0	58.0	97		10	30	29			0				
3	35.0	57.0	98		5	16	14			0				
4	33.0	57.0	93		10	30	28			0				
5	33.0	58.0	93		5	16	16			0				
6	32.0	57.0	98		5	18	16			0				
7	33.0	57.0	94		9	23	23			0				
8	34.0	58.0	95		10	25	23			0				
9	33.0	57.0	94		10	28	24			0				
10	32.0	54.0	92		9	25	23			0				
11	31.0	58.0	97		11	26	24			0				
12	33.0	60.0	95		16	31	28			0				
13	33.0	58.0	94		19	25	23			0				
14	29.0	58.0	92		13	24	18			0				
15	31.0	56.0	95		5	11	10			0				
16	31.0	55.0	95		12	27	25			0				
17	33.0	59.0	97		5	20	15			0				
18	31.0	52.0	96		10	34	28			0				
19	30.0	58.0	94		6	19	17			0				
20	34.0	58.0	99		5	11	12			0				
平均	32.5	57.0	94.9		9.1	23.0	20.8			0.0				

葉色	/		/		/	
----	---	--	---	--	---	--

坪刈株数	
------	--

月/日	項目	/	/	/	/
いもち病	数				
	程度				
紋 枯 病	数				
	程度				
	数				
	程度				
	数				
	程度				

月/日	項目	/	/	/	/
ヒメトビウンカ	匹				
セジロウンカ	匹				
トビイロウンカ	匹				
ツマグロヨコバイ	匹				
カメムシ類	匹				
	匹				
	匹				
	匹				

※病害数は25株中の発病株数を記入。病害程度は株全体から甚 (100~76) ・多 (75~51) ・中 (50~26) ・少 (25~1) ・無 (0%) で判断。
※害虫は、すくい取り10回振り (ウンカ類) ・20回振り (カメムシ類) の成虫・幼虫数計を記入。

備考 : ※ 雑草、水管理、土質、還元状態や肥料・農薬等耕種概要など特記事項を記入

2026年度 水稻生育・収量調査野帳

設置場所	水上町南油良	面積	29	前作
担当農家		品種	夢たんば	
耕種概要	播 種 /	代かき /	田植え	5月6日
			区 設定	

項目	草丈 (cm)				分けつ (本)				収穫期調査日 : 8/25 (実坪刈実施日 : 8/25) 条間 : 株間 :					
	①	②	③	④	①	②	③	④	稈長	穂長	全長	穂数	生葉数	平均穂数 代表株
月日	6/16	6/30	7/28	/	6/16	6/30	7/28	/						
1	35.0	59.0	97.0		11	14	16			0				
2	32.0	59.0	96.0		19	20	21			0				
3	36.0	57.0	92.0		12	14	14			0				
4	33.0	58.0	96.0		6	9	10			0				
5	36.0	58.0	101.0		16	18	23			0				
6	31.0	53.0	91.0		9	13	14			0				
7	31.0	60.0	95.0		12	25	23			0				
8	38.0	63.0	93.0		10	16	14			0				
9	34.0	58.0	98.0		4	9	8			0				
10	32.0	59.0	94.0		8	13	12			0				
11	40.0	61.0	97.0		9	16	12			0				
12	35.0	60.0	94.0		5	9	8			0				
13	39.0	60.0	92.0		20	9	10			0				
14	37.0	63.0	101.0		6	40	32			0				
15	36.0	58.0	94.0		17	9	7			0				
16	36.0	63.0	94.0		5	30	28			0				
17	35.0	57.0	90.0		4	8	7			0				
18	36.0	60.0	99.0		9	15	16			0				
19	32.0	60.0	92.0		19	32	23			0				
20	37.0	58.0	91.0		18	24	24			0				
平均	35.1	59.2	94.9		11.0	17.2	16.1			0.0				

葉色	/		/		/	
----	---	--	---	--	---	--

坪刈株数	
------	--

月/日	項目	/	/	/	/
いもち病	数				
	程度				
紋 枯 病	数				
	程度				
	数				
	程度				
	数				
	程度				

月/日	項目	/	/	/	/
	ヒメトビウンカ	匹			
	セジロウンカ	匹			
	トビイロウンカ	匹			
	ツマグロヨコバイ	匹			
	カメムシ類	匹			
		匹			
		匹			
		匹			

※病害数は25株中の発病株数を記入。病害程度は株全体から甚（100～76）・多（75～51）・中（50～26）・少（25～1）・無（0%）で判断。

※害虫は、すくい取り10回振り（ウンカ類）・20回振り（カメムシ類）の成虫・幼虫数計を記入。

備考：※ 雑草、水管理、土質、還元状態や肥料・農薬等耕種概要など特記事項を記入

--

2026年度 水稻生育・収量調査野帳

設置場所	水上町小野	面積	29	前作
担当農家		品種	一般コシヒカリ	
耕種概要	播 種 /	代かき /	田植え	5月3日
			区 設定	

項目	草丈 (cm)				分けつ (本)				収穫期調査日 : 8/25 (実坪刈実施日 : 8/25) 条間 : 株間 :					
	①	②	③	④	①	②	③	④	稈長	穂長	全長	穂数	生葉数	平均穂数 代表株
月日	6/16	6/30	7/28	/	6/16	6/30	7/28	/						
1	51.0	64.0	110.0		21	43	35			0				
2	48.0	62.0	110.0		23	39	31			0				
3	47.0	65.0	113.0		28	44	35			0				
4	47.0	57.0	113.0		15	26	22			0				
5	54.0	62.0	108.0		28	46	36			0				
6	48.0	64.0	111.0		12	20	18			0				
7	52.0	62.0	117.0		17	49	38			0				
8	48.0	60.0	109.0		13	34	29			0				
9	50.0	65.0	106.0		18	24	28			0				
10	50.0	65.0	113.0		13	41	34			0				
11	52.0	62.0	112.0		20	35	34			0				
12	55.0	65.0	104.0		22	32	25			0				
13	58.0	65.0	104.0		26	39	34			0				
14	54.0	61.0	112.0		28	46	28			0				
15	54.0	62.0	109.0		25	40	33			0				
16	54.0	66.0	103.0		40	42	33			0				
17	50.0	57.0	110.0		9	11	10			0				
18	58.0	65.0	110.0		28	28	20			0				
19	56.0	64.0	104.0		24	25	24			0				
20	60.0	66.0	108.0		22	25	38			0				
平均	52.3	63.0	109.3		21.6	34.5	29.3			0.0				

葉色	/		/		/	
----	---	--	---	--	---	--

坪刈株数	
------	--

月/日	項目	/	/	/	/
いもち病	数				
	程度				
紋 枯 病	数				
	程度				
	数				
	程度				
	数				
	程度				

月/日	項目	/	/	/	/
	ヒメトビウンカ	匹			
	セジロウンカ	匹			
	トビイロウンカ	匹			
	ツマグロヨコバイ	匹			
	カメムシ類	匹			
		匹			
		匹			
		匹			

※病害数は25株中の発病株数を記入。病害程度は株全体から甚（100～76）・多（75～51）・中（50～26）・少（25～1）・無（0%）で判断。

※害虫は、すくい取り10回振り（ウンカ類）・20回振り（カメムシ類）の成虫・幼虫数計を記入。

備考：※ 雑草、水管理、土質、還元状態や肥料・農薬等耕種概要など特記事項を記入

※稈長と全長は8月27日に再調査実施。

2026年度 水稻生育・収量調査野帳

設置場所	青垣町沢野	面積	5.4	前作
担当農家		品種	夢たんば	区設定
耕種概要	播 種 / 代かき / 田植え	5月6日		

項目	草丈 (cm)				分けつ (本)				収穫期調査日 : 8/25 (実坪刈実施日 : 8/25) 条間 : 株間 :					
	①	②	③	④	①	②	③	④	稈長	穂長	全長	穂数	生葉数	平均穂数 代表株
月日	6/16	6/30	7/28	/	6/16	6/30	7/28	/						
1	56.0	52.0	95.0		30	25	23			0				
2	49.0	57.0	94.0		18	19	13			0				
3	53.0	55.0	101.0		22	29	19			0				
4	49.0	50.0	92.0		24	21	19			0				
5	51.0	53.0	93.0		26	30	26			0				
6	51.0	55.0	100.0		29	28	24			0				
7	50.0	52.0	90.0		28	30	23			0				
8	49.0	55.0	94.0		24	18	17			0				
9	49.0	54.0	98.0		25	32	22			0				
10	52.0	55.0	94.0		27	23	23			0				
11	54.0	54.0	93.0		19	29	24			0				
12	48.0	54.0	93.0		27	25	19			0				
13	49.0	56.0	99.0		19	22	15			0				
14	47.0	56.0	91.0		27	23	12			0				
15	48.0	54.0	100.0		29	31	18			0				
16	50.0	58.0	101.0		26	23	23			0				
17	52.0	56.0	95.0		21	33	26			0				
18	51.0	56.0	97.0		19	23	20			0				
19	47.0	55.0	95.0		18	26	22			0				
20	49.0	56.0	95.0		21	29	28			0				
平均	50.2	54.7	95.5		24.0	26.0	20.8			0.0				

葉色	/	/	/	/
----	---	---	---	---

坪刈株数	
------	--

月/日	項目	/	/	/	/
いもち病	数				
	程度				
紋 枯 病	数				
	程度				
	数				
	程度				
	数				
	程度				

月/日	項目	/	/	/	/
	ヒメトビウンカ	匹			
	セジロウンカ	匹			
	トビイロウンカ	匹			
	ツマグロヨコバイ	匹			
	カメムシ類	匹			
		匹			
		匹			
		匹			

※病害数は25株中の発病株数を記入。病害程度は株全体から甚（100～76）・多（75～51）・中（50～26）・少（25～1）・無（0%）で判断。

※害虫は、すくい取り10回振り（ウンカ類）・20回振り（カメムシ類）の成虫・幼虫数計を記入。

備考：※ 雑草、水管理、土質、還元状態や肥料・農薬等耕種概要など特記事項を記入

7/28ごま葉枯れ少発生

2026年度 水稻生育・収量調査野帳

設置場所	青垣町東芦田	面積	18.9	前作
担当農家		品種	一般コシヒカリ	
耕種概要	播 種	/	代かき	/
			田植え	5月10日
			区 設定	

項目	草丈 (cm)				分けつ (本)				収穫期調査日 : 8/25 (実坪刈実施日 : 8/25) 条間 : 株間 :					
	①	②	③	④	①	②	③	④						
月日	6/16	6/30	7/28	/	6/16	6/30	7/28	/	稈長	穂長	全長	穂数	生葉数	平均穂数 代表株
1	46.0	60.0	104.0		24	35	35			0				
2	46.0	59.0	107.0		12	17	13			0				
3	45.0	57.0	102.0		20	22	18			0				
4	44.0	60.0	99.0		26	25	18			0				
5	44.0	57.0	105.0		24	24	21			0				
6	47.0	62.0	99.0		24	27	22			0				
7	44.0	61.0	98.0		14	16	12			0				
8	44.0	57.0	106.0		21	22	17			0				
9	42.0	59.0	99.0		24	25	16			0				
10	46.0	59.0	96.0		20	36	16			0				
11	41.0	58.0	102.0		14	27	22			0				
12	42.0	56.0	100.0		25	26	18			0				
13	44.0	59.0	104.0		21	23	24			0				
14	42.0	59.0	108.0		24	21	22			0				
15	47.0	60.0	103.0		24	25	18			0				
16	45.0	61.0	102.0		21	24	18			0				
17	46.0	63.0	101.0		32	34	28			0				
18	47.0	58.0	104.0		15	20	16			0				
19	44.0	60.0	99.0		32	30	24			0				
20	42.0	54.0	99.0		26	27	18			0				
平均	44.4	59.0	101.9		22.2	25.3	19.8			0.0				

葉色	/		/		/	
----	---	--	---	--	---	--

坪刈株数	
------	--

月/日	項目	/	/	/	/
いもち病	数				
	程度				
紋 枯 病	数				
	程度				
	数				
	程度				
	数				
	程度				

月/日	項目	/	/	/	/
	ヒメトビウンカ	匹			
	セジロウンカ	匹			
	トビイロウンカ	匹			
	ツマグロヨコバイ	匹			
	カメムシ類	匹			
		匹			
		匹			
		匹			

※病害数は25株中の発病株数を記入。病害程度は株全体から甚（100～76）・多（75～51）・中（50～26）・少（25～1）・無（0％）で判断。

※害虫は、すくい取り10回振り（ウンカ類）・20回振り（カメムシ類）の成虫・幼虫数計を記入。

備考：※ 雑草、水管理、土質、還元状態や肥料・農薬等耕種概要など特記事項を記入

2026年度 水稻生育・収量調査野帳

設置場所	市島町上竹田	面積	10.7	前作
担当農家		品種	一般コシヒカリ	
耕種概要	播 種 / 代かき / 田植え	5月9日	区 設定	

項目	草丈 (cm)				分けつ (本)				収穫期調査日 : 8/25 (実坪刈実施日 : 8/25) 条間 : 株間 :					
	①	②	③	④	①	②	③	④						
月日	6/16	6/30	7/28	/	6/16	6/30	7/28	/	稈長	穂長	全長	穂数	生葉数	平均穂数 代表株
1	41.0	57.0	105.0		19	35	37			0				
2	36.0	54.0	103.0		4	10	9			0				
3	44.0	57.0	110.0		20	31	32			0				
4	44.0	58.0	98.0		17	24	24			0				
5	44.0	58.0	103.0		16	23	24			0				
6	44.0	54.0	93.0		23	34	31			0				
7	40.0	55.0	97.0		15	23	21			0				
8	41.0	54.0	95.0		18	25	23			0				
9	47.0	58.0	106.0		10	19	19			0				
10	43.0	60.0	103.0		10	17	16			0				
11	40.0	51.0	95.0		14	26	25			0				
12	44.0	57.0	94.0		14	17	15			0				
13	45.0	58.0	99.0		23	34	29			0				
14	44.0	56.0	95.0		22	36	32			0				
15	43.0	54.0	99.0		7	9	13			0				
16	43.0	57.0	100.0		22	33	29			0				
17	42.0	52.0	94.0		16	26	23			0				
18	44.0	64.0	97.0		8	14	14			0				
19	45.0	53.0	100.0		27	34	34			0				
20	47.0	59.0	100.0		16	22	21			0				
平均	43.1	56.3	99.3		16.1	24.6	23.6			0.0				

葉色	/		/		/	
----	---	--	---	--	---	--

坪刈株数	
------	--

月/日	項目	/	/	/	/
いもち病	数				
	程度				
紋 枯 病	数				
	程度				
	数				
	程度				
	数				
	程度				

月/日	項目	/	/	/	/
	ヒメトビウンカ	匹			
	セジロウンカ	匹			
	トビイロウンカ	匹			
	ツマグロヨコバイ	匹			
	カメムシ類	匹			
		匹			
		匹			
		匹			

※病害数は25株中の発病株数を記入。病害程度は株全体から甚（100～76）・多（75～51）・中（50～26）・少（25～1）・無（0%）で判断。

※害虫は、すくい取り10回振り（ウンカ類）・20回振り（カメムシ類）の成虫・幼虫数計を記入。

備考：※ 雑草、水管理、土質、還元状態や肥料・農薬等耕種概要など特記事項を記入

2026年度 水稻生育・収量調査野帳

設置場所	市島町乙河内	面積	20	前作	夢たんば
担当農家		品種	夢たんば	区 設定	
耕種概要	播 種 /	代かき /	田植え 4/26		

項目	草丈 (cm)				分けつ (本)				収穫期調査日 : 8/25 (実坪刈実施日 : 8/25) 条間 : 株間 :					
	①	②	③	④	①	②	③	④						
月日	6/16	6/30	7/28	/	6/16	6/30	7/28	/	稈長	穂長	全長	穂数	生葉数	平均穂数 代表株
1	52.0	72.0	107.0		18	27	28			0				
2	48.0	74.0	103.0		6	11	10			0				
3	53.0	73.0	105.0		19	28	28			0				
4	44.0	67.0	102.0		12	15	16			0				
5	57.0	72.0	104.0		28	33	28			0				
6	47.0	65.0	102.0		20	28	26			0				
7	47.0	69.0	99.0		5	15	11			0				
8	54.0	73.0	108.0		11	22	19			0				
9	51.0	71.0	109.0		32	38	37			0				
10	51.0	66.0	105.0		17	24	26			0				
11	49.0	72.0	107.0		18	19	23			0				
12	51.0	73.0	110.0		22	30	36			0				
13	52.0	66.0	104.0		6	11	12			0				
14	47.0	71.0	109.0		17	30	31			0				
15	53.0	70.0	108.0		19	32	36			0				
16	54.0	71.0	108.0		18	32	31			0				
17	55.0	71.0	100.0		12	14	14			0				
18	45.0	70.0	106.0		12	22	28			0				
19	51.0	71.0	105.0		15	28	22			0				
20	52.0	72.0	106.0		13	22	23			0				
平均	50.7	70.5	105.4		16.0	24.1	24.3							

葉色	/		/		/	
----	---	--	---	--	---	--

坪刈株数	39
------	----

2

月/日	項目	/	/	/	/
いもち病	数				
	程度				
紋 枯 病	数				
	程度				
	数				
	程度				
	数				
	程度				

月/日	項目	/	/	/	/
	ヒメトビウンカ	匹			
	セジロウンカ	匹			
	トビイロウンカ	匹			
	ツマグロヨコバイ	匹			
	カメムシ類	匹			
		匹			
		匹			
		匹			

※病害数は25株中の発病株数を記入。病害程度は株全体から甚（100～76）・多（75～51）・中（50～26）・少（25～1）・無（0％）で判断。

※害虫は、すくい取り10回振り（ウンカ類）・20回振り（カメムシ類）の成虫・幼虫数計を記入。

備考：※ 雑草、水管理、土質、還元状態や肥料・農薬等耕種概要など特記事項を記入

--

2026年度 水稻生育・収量調査野帳

設置場所	春日町多利	面積	19.9	前作
担当農家		品種	一般コシヒカリ	
耕種概要	播種	/	代かき	/
			田植え	5月5日
		区設定		

項目	草丈 (cm)				分けつ (本)				収穫期調査日 : 8/25 (実坪刈実施日 : 8/25) 条間 : 株間 :					
	①	②	③	④	①	②	③	④						
月日	6/16	6/30	7/28	/	6/16	6/30	7/28	/	稈長	穂長	全長	穂数	生葉数	平均穂数 代表株
1	50.0	71.0	108.0		24	31	30			0				
2	52.0	69.0	113.0		24	37	26			0				
3	49.0	67.0	105.0		30	31	27			0				
4	55.0	71.0	111.0		33	43	34			0				
5	51.0	67.0	108.0		26	31	23			0				
6	54.0	68.0	106.0		18	30	26			0				
7	45.0	67.0	103.0		9	21	14			0				
8	50.0	68.0	103.0		21	27	21			0				
9	55.0	67.0	104.0		24	28	25			0				
10	53.0	68.0	108.0		22	31	21			0				
11	52.0	67.0	106.0		21	34	21			0				
12	51.0	65.0	105.0		20	24	13			0				
13	53.0	67.0	107.0		14	34	23			0				
14	52.0	67.0	108.0		16	17	14			0				
15	53.0	67.0	106.0		23	24	25			0				
16	52.0	67.0	105.0		20	20	24			0				
17	49.0	64.0	103.0		25	18	20			0				
18	52.0	63.0	106.0		21	20	21			0				
19	51.0	62.0	103.0		20	17	19			0				
20	51.0	61.0	102.0		20	15	15			0				
平均	51.5	66.7	106.0		21.6	26.7	22.1							

葉色	/		/		/	
----	---	--	---	--	---	--

坪刈株数	
------	--

月/日	項目	/	/	/	/
いもち病	数				
	程度				
紋枯病	数				
	程度				
	数				
	程度				
	数				
	程度				

月/日	項目	/	/	/	/
	ヒメトビウンカ	匹			
	セジロウンカ	匹			
	トビイロウンカ	匹			
	ツマグロヨコバイ	匹			
	カメムシ類	匹			
		匹			
		匹			
		匹			

※病害数は25株中の発病株数を記入。病害程度は株全体から甚（100～76）・多（75～51）・中（50～26）・少（25～1）・無（0%）で判断。

※害虫は、すくい取り10回振り（ウンカ類）・20回振り（カメムシ類）の成虫・幼虫数計を記入。

備考：※ 雑草、水管理、土質、還元状態や肥料・農薬等耕種概要など特記事項を記入

--

2026年度 水稻生育・収量調査野帳

設置場所	春日町稲塚	面積	19.4	前作	コシ(夢たんば)
担当農家		品種	夢たんば	区設定	
耕種概要	播種 / 代かき / 田植え	5月1日			

項目	草丈 (cm)				分けつ (本)				収穫期調査日 : 8/25 (実坪刈実施日 : 8/25) 条間 : 株間 :					
	①	②	③	④	①	②	③	④	稈長	穂長	全長	穂数	生葉数	平均穂数 代表株
月日	6/16	6/30	7/28	/	6/16	6/30	7/28	/						
1	48.0	65.0	117.0		20	33	34			0				
2	48.0	66.0	118.0		16	29	27			0				
3	49.0	67.0	116.0		19	27	26			0				
4	54.0	68.0	112.0		16	28	27			0				
5	54.0	64.0	113.0		22	32	36			0				
6	50.0	65.0	115.0		17	26	24			0				
7	47.0	70.0	112.0		22	25	26			0				
8	57.0	69.0	117.0		23	31	29			0				
9	49.0	71.0	114.0		22	31	27			0				
10	52.0	67.0	119.0		20	29	31			0				
11	51.0	67.0	116.0		22	34	31			0				
12	47.0	68.0	116.0		15	27	26			0				
13	52.0	68.0	123.0		18	29	29			0				
14	47.0	68.0	123.0		18	27	26			0				
15	54.0	69.0	120.0		23	37	35			0				
16	54.0	70.0	119.0		17	39	38			0				
17	50.0	68.0	120.0		24	36	36			0				
18	52.0	68.0	124.0		24	25	33			0				
19	54.0	68.0	120.0		17	38	36			0				
20	54.0	70.0	121.0		13	23	19			0				
平均	51.2	67.8	117.8		19.4	30.3	29.8							

葉色	/	/	/	/
----	---	---	---	---

坪刈株数	
------	--

月/日	項目	/	/	/	/
いもち病	数				
	程度				
紋枯病	数				
	程度				
	数				
	程度				
	数				
	程度				

月/日	項目	/	/	/	/
	ヒメトビウンカ	匹			
	セジロウンカ	匹			
	トビイロウンカ	匹			
	ツマグロヨコバイ	匹			
	カメムシ類	匹			
		匹			
		匹			
		匹			

※病害数は25株中の発病株数を記入。病害程度は株全体から甚(100~76)・多(75~51)・中(50~26)・少(25~1)・無(0%)で判断。

※害虫は、すくい取り10回振り(ウンカ類)・20回振り(カメムシ類)の成虫・幼虫数計を記入。

備考：※ 雑草、水管理、土質、還元状態や肥料・農薬等耕種概要など特記事項を記入

--