

丹波市水稻生育調査結果

調査日：

平年値集計表

年度	田植日	草丈(cm)				分げつ(本)				出穂日 (推測)	成熟日 (推測)	成熟日 (坪刈日)	稈長 (cm)	穂長 (cm)	全長 (cm)	穂数 (本)	穂数 (実刈・㎡)	備考
		6月中旬	6月下旬	7月下旬	8月上旬	6月中旬	6月下旬	7月下旬	8月上旬									
16年度	—	45.6	61.1	—	—	22.6	—	—	—	—	—	9/11	—	—	—	—	—	—
17年度	5/4	39.7	71.2	87.1	—	25.6	29.8	24.6	—	7/23	—	—	91.0	18.6	109.6	25.3	—	—
18年度	5/15	37.8	63.6	78.7	—	13.6	21.0	20.6	—	8/1	—	9/7	87.6	17.5	105.1	19.7	—	—
19年度	5/16	36.9	66.4	77.1	—	14.9	21.8	21.2	—	8/6	—	—	85.8	17.4	103.2	19.3	—	—
20年度	—	38.9	57.0	74.7	—	15.0	21.3	21.0	—	8/6	—	—	85.8	17.4	103.2	19.3	—	—
21年度	5/12	32.2	59.0	79.1	—	12.8	21.8	22.7	—	—	—	8/31	96.8	18.3	115.1	20.5	—	—
22年度	—	26.4	50.0	80.8	—	13.3	17.2	18.9	—	—	—	8/31	85.0	19.4	104.4	19.2	—	—
23年度	5/12	33.3	—	84.0	—	16.6	—	25.1	—	—	—	8/31	—	—	—	—	—	—
24年度	5/8	34.1	55.2	—	106.4	14.4	23.7	—	21.8	7/28	—	8/31	85.6	18.8	104.3	20.6	—	—
25年度	5/10	42.3	60.8	95.9	—	18.3	21.9	22.8	—	7/28	—	8/30	89.3	17.8	107.1	21.3	—	—
26年度	5/8	37.4	53.8	91.9	—	14.9	27.8	22.0	—	7/27	—	—	87.7	18.4	106.1	20.0	—	—
27年度	5/12	29.8	46.4	86.3	—	10.6	21.5	23.8	—	7/30	—	9/3	85.2	18.2	103.3	22.6	—	49.3
28年度	5/11	31.7	53.6	97.4	—	11.9	20.1	20.9	—	7/28	—	9/1	86.5	18.5	104.9	19.8	—	50.2
29年度	5/9	28.7	37.9	96.1	—	12.6	21.2	23.2	—	7/26	—	8/30	83.6	19.0	102.6	23.2	—	45.0
30年度	5/6	40.8	55.1	95.6	—	16.5	25.2	21.2	—	7/21	—	8/27	82.5	20.1	102.7	20.4	—	49.0
元年度	5/7	38.5	52.6	91.8	—	19.9	30.4	22.9	—	7/29	9/1	8/28	86.0	18.1	104.1	22.9	301.5	—
2年度	5/7	46.9	63.9	97.9	—	17.6	24.2	21.2	—	7/25	—	8/27	87.0	17.5	104.5	19.8	298.4	—
3年度	5/10	39.5	59.0	100.8	—	19.2	26.8	23.5	—	7/27	9/1	8/31	89.2	18.3	107.5	22.5	324.1	—
4年度	5/6	35.1	63.7	103.5	—	17.7	25.7	25.7	—	7/28	—	8/31	89.8	15.4	105.2	25.2	413.7	—
5年度	5/6	37.9	58.7	102.2	—	18.7	24.8	21.8	—	—	—	—	86.0	17.6	103.7	21.6	303.5	—
6年度	—	32.9	59.4	102.9	—	16.6	25.1	23.7	—	—	—	—	88.5	16.6	106.7	23.1	320.0	—
7年度	—	41.1	69.9	103.5	—	17.2	24.9	22.1	—	—	—	—	85.3	18.3	103.7	22.2	325.3	—
8年度	5/7	44.4	61.7	102.7	—	17.7	25.8	22.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
平年値	5/9	37.0	58.2	91.9	—	16.4	23.9	22.5	—	7/28	—	8/31	87.2	18.1	105.4	21.4	—	—

令和8年度丹波市定点生育調査集計値

調査地点	田植日	草丈(cm)				分げつ(本)				出穂日 (推測)	成熟日 (推測)	成熟日 (坪刈日)	稈長 (cm)	穂長 (cm)	全長 (cm)	穂数 (株)	穂数 (実刈・㎡)	備考
		6/16	6/30	7/28	—	6/16	6/30	7/28	—									
1 柏原 拳田	5/14	42.8	59.4	96.7	—	18.5	27.2	19.5	—	—	—	8/25	82.6	18.4	100.9	16.5	259.2	夢たんば
2 柏原 下小倉	5/15	33.1	51.8	100.3	—	11.4	19.9	22.5	—	—	—	8/25	89.3	18.5	107.8	19.2	279.3	一般コシヒカリ
3 山南 北和田	5/6	46.8	76.0	110.8	—	21.7	30.9	25.8	—	—	—	8/25	89.3	19.3	108.5	20.5	335.5	夢たんば
4 山南 奥野々	5/23	32.5	57.0	94.9	—	9.1	23.0	20.8	—	—	—	8/25	81.7	17.1	98.8	18.1	268.8	一般コシヒカリ
5 氷上 南油良	5/6	35.1	59.2	94.9	—	11.0	17.2	16.1	—	—	—	8/25	80.5	18.2	98.7	15.6	274.2	夢たんば
6 氷上 小野	5/3	52.3	63.0	109.3	—	21.6	34.5	29.3	—	—	—	8/25	87.7	18.3	105.9	24.5	296.4	一般コシヒカリ
7 青垣 沢野	5/6	50.2	54.7	95.5	—	24.0	26.0	20.8	—	—	—	8/25	78.2	19.8	97.9	16.1	233.5	夢たんば
8 青垣 東芦田	5/10	44.4	59.0	101.9	—	22.2	25.3	19.8	—	—	—	8/25	79.5	19.0	98.5	19.1	306.8	一般コシヒカリ
9 市島 上竹田	5/9	43.1	56.3	99.3	—	16.1	24.6	23.6	—	—	—	8/25	78.9	20.1	99.0	22.5	252.3	一般コシヒカリ
10 市島 乙河内	4/26	50.7	70.5	105.4	—	16.0	24.1	24.3	—	—	—	8/25	86.2	19.8	106.0	22.9	367.0	夢たんば
11 春日 多利	5/5	51.5	66.7	106.0	—	21.6	26.7	22.1	—	—	—	8/25	86.0	19.8	105.8	21.6	228.6	一般コシヒカリ
12 春日 稲塚	5/1	51.2	67.8	117.8	—	19.4	30.3	29.8	—	—	—	8/25	91.6	19.8	111.4	30.7	418.6	夢たんば
平均値	5/7	44.4	61.7	102.7	—	17.7	25.8	22.8	—	—	—	—	84.3	19.0	103.3	20.6	293.3	—
平年値比%	—	120.0	106.1	111.7	—	107.6	107.8	101.7	—	—	—	—	96.6	105.1	98.0	96.1	—	—
前年対比%	—	135.0	103.9	99.8	—	106.7	102.7	96.4	—	—	—	—	95.3	114.3	96.7	89.3	—	—

2026年度 水稻生育・収量調査野帳

設置場所	柏原町拳田		面積	27.4	前作
担当農家			品種	夢たんば	
耕種概要	播 種	/	代かき	/	田植え 5月14日
			区 設定		

項目	草丈 (cm)				分けつ (本)				収穫期調査日 : 8/25 (実坪刈実施日 : 8/25) 条間 : 31cm 株間 : 21cm					
	①	②	③	④	①	②	③	④	稈長	穂長	全長	穂数	生葉数	平均穂数 代表株
月日	6/16	6/30	7/28	/	6/16	6/30	7/28	/						
1	44.0	58.0	97.0		14	25	18		78	19	97	21		
2	45.0	58.0	98.0		27	32	24		85	19	104	20		
3	40.0	59.0	96.0		22	29	17		87	15	102	18		○
4	42.0	59.0	94.0		29	35	22		84	18	102	17		
5	42.0	57.0	99.0		32	40	28		82	15	97	13		
6	43.0	61.0	98.0		16	29	17		84	17	101	14		
7	43.0	64.0	100.0		7	19	16		84	21	105	21		
8	45.0	62.0	97.0		14	16	15		80	21	101	22		
9	42.5	61.0	98.0		14	25	17		86	19	105	12		
10	37.0	60.0	90.0		17	15	14		85	17	102	13		
11	40.5	58.0	97.0		22	28	21		81	18	99	16		
12	45.0	59.0	97.0		13	31	19		84	20	104	18		
13	43.0	61.0	98.0		13	21	15		81	20	101	15		
14	44.0	64.0	100.0		13	24	18		81	20	101	16		
15	45.0	60.0	94.0		10	13	17		82	19	101	15		
16	46.0	59.0	93.0		21	33	24		84	18	102	16		
17	40.0	55.0	96.0		19	25	19		78	16	94	17		○
18	45.0	58.0	95.0		15	25	17		84	18	102	14		
19	40.0	57.0	100.0		18	35	25		79	18	97	17		
20	43.0	57.0	97.0		34	43	27		82	19	101	14		
平均	42.8	59.4	96.7		18.5	27.2	19.5		82.6	18.4	100.9	16.5		

葉色	/		/		/	
----	---	--	---	--	---	--

坪刈株数	52	欠○
------	----	----

月/日	項目	/	/	/	/
いもち病	数				
	程度				
紋 枯 病	数				
	程度				
	数				
	程度				
	数				
	程度				

月/日	項目	/	/	/	/
	ヒメトビウンカ	匹			
	セジロウンカ	匹			
	トビイロウンカ	匹			
	ツマグロヨコバイ	匹			
	カメムシ類	匹			
		匹			
		匹			
		匹			

※病害数は25株中の発病株数を記入。病害程度は株全体から甚 (100~76) ・多 (75~51) ・中 (50~26) ・少 (25~1) ・無 (0%) で判断。

※害虫は、すくい取り10回振り (ウンカ類) ・20回振り (カメムシ類) の成虫・幼虫数計を記入。

備考 : ※ 雑草、水管理、土質、還元状態や肥料・農薬等耕種概要など特記事項を記入

--

2026年度 水稻生育・収量調査野帳

設置場所	柏原町下小倉			面積	15.4	前作
担当農家				品種	一般 コシヒカリ	
耕種概要	播 種	/	代かき	/	田植え	5月15日
				区 設定		

項目	草丈 (cm)				分けつ (本)				収穫期調査日 : 8/25 (実坪刈実施日 : 8/25) 条間 : 28cm 株間 : 23cm					
	①	②	③	④	①	②	③	④	稈長	穂長	全長	穂数	生葉数	平均穂数 代表株
月日	6/16	6/30	7/28	/	6/16	6/30	7/28	/						
1	34.0	57.0	98		15	20	28		87	18	105	29		
2	31.0	50.0	100		7	18	21		90	17	107	18		
3	35.0	53.0	102		9	21	23		94	17	111	21		
4	34.0	53.0	96		7	21	21		89	18	107	21		
5	33.0	50.0	103		9	19	20		90	19	109	21		
6	35.0	55.0	107		9	18	21		89	18	107	18		
7	33.0	51.0	97		8	17	20		84	21	105	17		
8	33.0	50.0	98		8	21	25		86	16	102	20		○
9	32.0	52.0	100		9	20	24		89	20	109	20		
10	33.0	53.0	106		9	20	22		89	21	110	18		
11	30.0	50.0	96		5	13	15		88	16	104	13		
12	32.0	54.0	101		9	19	24		92	19	111	16		
13	34.0	48.0	100		8	17	20		91	19	110	16		
14	32.0	49.0	103		4	9	15		90	21	111	12		
15	35.0	52.0	102		15	28	29		91	19	110	23		
16	32.0	51.0	97		12	15	16		89	20	109	15		
17	33.0	54.0	101		24	27	27		92	18	110	22		
18	32.0	54.0	102		23	25	25		88	19	107	21		
19	33.0	49.0	98		19	27	26		90	14	104	20		○
20	35.0	50.0	99		18	23	27		88	19	107	23		
平均	33.1	51.8	100.3		11.4	19.9	22.5		89.3	18.5	107.8	19.2		

葉色	/	/	/	/
----	---	---	---	---

坪刈株数	48	欠○
------	----	----

月/日	項目	/	/	/	/
いもち病	数				
	程度				
紋 枯 病	数				
	程度				
	数				
	程度				
	数				
	程度				

月/日	項目	/	/	/	/
	ヒメトビウンカ	匹			
	セジロウンカ	匹			
	トビイロウンカ	匹			
	ツマグロヨコバイ	匹			
	カメムシ類	匹			
		匹			
		匹			
		匹			

※病害数は25株中の発病株数を記入。病害程度は株全体から甚 (100~76) ・多 (75~51) ・中 (50~26) ・少 (25~1) ・無 (0%) で判断。

※害虫は、すくい取り10回振り (ウンカ類) ・20回振り (カメムシ類) の成虫・幼虫数計を記入。

備考 : ※ 雑草、水管理、土質、還元状態や肥料・農薬等耕種概要など特記事項を記入

--

2026年度 水稻生育・収量調査野帳

設置場所	山南町梶		面積	13.6	前作
担当農家			品種	夢たんば	
耕種概要	播 種	/	代かき	/	田植え 5月6日
			区 設定		

項目	草丈 (cm)				分けつ (本)				収穫期調査日 : 8/25 (実坪刈実施日 : 8/25) 条間 : 30cm 株間 : 20cm					
	①	②	③	④	①	②	③	④						
月日	6/16	6/30	7/28	/	6/16	6/30	7/28	/	稈長	穂長	全長	穂数	生葉数	平均穂数 代表株
1	44.0	77.0	107		10	15	12		90	16	106	10		
2	50.0	80.0	113		33	37	28		98	18	116	28		
3	51.0	77.0	112		23	31	24		89	20	109	25		
4	47.0	79.0	116		41	41	35		94	18	112	31		
5	50.0	79.0	114		24	26	22		87	22	109	22		
6	46.0	79.0	112		17	24	22		90	19	109	23		
7	45.0	74.0	112		19	31	23		91	20	111	19		
8	49.0	80.0	112		23	36	27		90	16	106	22		
9	51.0	77.0	117		16	35	26		89	21	110	23		
10	48.0	76.0	111		20	33	27		88	17	105	21		
11	40.0	76.0	116		19	27	25		91	16	107	16		
12	46.0	75.0	108		24	32	34		83	21	104	23		
13	41.0	73.0	105		16	20	21		86	19	105	16		
14	50.0	75.0	108		23	33	30		90	18	108	20		○
15	49.0	77.0	107		19	26	23		90	20	110	20		○
16	48.0	73.0	112		24	31	28		85	21	106	17		
17	44.0	76.0	106		21	39	32		85	22	107	18		
18	46.0	74.0	109		20	31	22		91	21	112	18		
19	43.0	70.0	108		19	31	24		87	19	106	17		
20	48.0	72.0	110		23	38	30		91	21	112	21		
平均	46.8	76.0	110.8		21.7	30.9	25.8		89.3	19.3	108.5	20.5		

葉色	/		/		/	
----	---	--	---	--	---	--

坪刈株数	54	欠○
------	----	----

月/日	項目	/	/	/	/
いもち病	数				
	程度				
紋 枯 病	数				
	程度				
	数				
	程度				
	数				
	程度				

月/日	項目	/	/	/	/
	ヒメトビウンカ	匹			
	セジロウンカ	匹			
	トビイロウンカ	匹			
	ツマグロヨコバイ	匹			
	カメムシ類	匹			
		匹			
		匹			
		匹			

※病害数は25株中の発病株数を記入。病害程度は株全体から甚 (100~76) ・多 (75~51) ・中 (50~26) ・少 (25~1) ・無 (0%) で判断。

※害虫は、すくい取り10回振り (ウンカ類) ・20回振り (カメムシ類) の成虫・幼虫数計を記入。

備考 : ※ 雑草、水管理、土質、還元状態や肥料・農薬等耕種概要など特記事項を記入

--

2026年度 水稻生育・収量調査野帳

設置場所	山南町奥野々			面積	12.3	前作
担当農家				品種	一般コシヒカリ	
耕種概要	播 種	/	代かき	/	田植え	5月23日
				区 設定		

項目	草丈 (cm)				分げつ (本)				収穫期調査日 : 8/25 (実坪刈実施日 : 8/25) 条間 : 40cm 株間 : 20cm					
	①	②	③	④	①	②	③	④	稈長	穂長	全長	穂数	生葉数	平均穂数 代表株
月日	6/16	6/30	7/28	/	6/16	6/30	7/28	/						
1	32.0	54.0	89		6	21	20		78	16	94	17		○
2	36.0	58.0	97		10	30	29		84	16	100	24		
3	35.0	57.0	98		5	16	14		82	16	98	12		
4	33.0	57.0	93		10	30	28		83	15	98	25		
5	33.0	58.0	93		5	16	16		79	19	98	16		
6	32.0	57.0	98		5	18	16		81	18	99	16		
7	33.0	57.0	94		9	23	23		79	17	96	26		
8	34.0	58.0	95		10	25	23		84	16	100	20		
9	33.0	57.0	94		10	28	24		79	17	96	20		
10	32.0	54.0	92		9	25	23		82	17	99	18		○
11	31.0	58.0	97		11	26	24		76	20	96	17		
12	33.0	60.0	95		16	31	28		82	16	98	19		
13	33.0	58.0	94		19	25	23		78	18	96	17		
14	29.0	58.0	92		13	24	18		83	14	97	16		
15	31.0	56.0	95		5	11	10		84	16	100	11		
16	31.0	55.0	95		12	27	25		82	19	101	20		
17	33.0	59.0	97		5	20	15		86	18	104	16		
18	31.0	52.0	96		10	34	28		87	19	106	22		
19	30.0	58.0	94		6	19	17		80	18	98	17		
20	34.0	58.0	99		5	11	12		84	17	101	13		
平均	32.5	57.0	94.9		9.1	23.0	20.8		81.7	17.1	98.8	18.1		

葉色	/		/		/	
----	---	--	---	--	---	--

坪刈株数	49	欠0
------	----	----

月/日	項目	/	/	/	/
いもち病	数				
	程度				
紋 枯 病	数				
	程度				
	数				
	程度				
	数				
	程度				

月/日	項目	/	/	/	/
ヒメトビウンカ	匹				
セジロウンカ	匹				
トビイロウンカ	匹				
ツマグロヨコバイ	匹				
カメムシ類	匹				
	匹				
	匹				

※病害数は25株中の発病株数を記入。病害程度は株全体から甚(100~76)・多(75~51)・中(50~26)・少(25~1)・無(0%)で判断。

※害虫は、すくい取り10回振り(ウンカ類)・20回振り(カメムシ類)の成虫・幼虫数計を記入。

備考：※ 雑草、水管理、土質、還元状態や肥料・農薬等耕種概要など特記事項を記入

--

2026年度 水稻生育・収量調査野帳

設置場所	水上町南油良			面積	29	前作
担当農家				品種	夢たんば	
耕種概要	播 種	/	代かき	/	田植え	5月6日
				区 設定		

項目	草丈 (cm)				分けつ (本)				収穫期調査日 : 8/25 (実坪刈実施日 : 8/25) 条間 : 30cm 株間 : 18cm					
	①	②	③	④	①	②	③	④	稈長	穂長	全長	穂数	生葉数	平均穂数 代表株
月日	6/16	6/30	7/28	/	6/16	6/30	7/28	/						
1	35.0	59.0	97.0		11	14	16		74	20	94	15		
2	32.0	59.0	96.0		19	20	21		85	16	101	13		
3	36.0	57.0	92.0		12	14	14		80	18	98	14		
4	33.0	58.0	96.0		6	9	10		80	16	96	11		
5	36.0	58.0	101.0		16	18	23		81	19	100	13		
6	31.0	53.0	91.0		9	13	14		77	18	95	15		
7	31.0	60.0	95.0		12	25	23		82	19	101	25		
8	38.0	63.0	93.0		10	16	14		82	20	102	15		
9	34.0	58.0	98.0		4	9	8		75	19	94	8		
10	32.0	59.0	94.0		8	13	12		75	20	95	13		
11	40.0	61.0	97.0		9	16	12		85	18	103	15		
12	35.0	60.0	94.0		5	9	8		80	19	99	8		
13	39.0	60.0	92.0		20	9	10		83	20	103	10		
14	37.0	63.0	101.0		6	40	32		85	18	103	33		
15	36.0	58.0	94.0		17	9	7		80	19	99	7		
16	36.0	63.0	94.0		5	30	28		75	21	96	30		
17	35.0	57.0	90.0		4	8	7		81	14	95	6		
18	36.0	60.0	99.0		9	15	16		81	17	98	13		○
19	32.0	60.0	92.0		19	32	23		82	18	100	23		
20	37.0	58.0	91.0		18	24	24		87	14	101	25		
平均	35.1	59.2	94.9		11.0	17.2	16.1		80.5	18.2	98.7	15.6		

葉色	/		/		/	
----	---	--	---	--	---	--

坪刈株数	58	欠2
------	----	----

月/日	項目	/	/	/	/
いもち病	数				
	程度				
紋 枯 病	数				
	程度				
	数				
	程度				
	数				
	程度				

月/日	項目	/	/	/	/
	ヒメトビウンカ	匹			
	セジロウンカ	匹			
	トビイロウンカ	匹			
	ツマグロヨコバイ	匹			
	カメムシ類	匹			
		匹			
		匹			
		匹			

※病害数は25株中の発病株数を記入。病害程度は株全体から甚 (100~76) ・多 (75~51) ・中 (50~26) ・少 (25~1) ・無 (0%) で判断。

※害虫は、すくい取り10回振り (ウンカ類) ・20回振り (カメムシ類) の成虫・幼虫数計を記入。

備考 : ※ 雑草、水管理、土質、還元状態や肥料・農薬等耕種概要など特記事項を記入

--

2026年度 水稻生育・収量調査野帳

設置場所	水上町小野			面積	29	前作
担当農家				品種	一般コシヒカリ	
耕種概要	播 種	/	代かき	/	田植え	5月3日
				区 設定		

項目	草丈 (cm)				分げつ (本)				収穫期調査日 : 8/25 (実坪刈実施日 : 8/25) 条間 : 30cm 株間 : 29cm					
	①	②	③	④	①	②	③	④	稈長	穂長	全長	穂数	生葉数	平均穂数 代表株
月日	6/16	6/30	7/28	/	6/16	6/30	7/28	/						
1	51.0	64.0	110.0		21	43	35		97	20	117	41		
2	48.0	62.0	110.0		23	39	31		83	21	104	30		
3	47.0	65.0	113.0		28	44	35		89	17	106	34		
4	47.0	57.0	113.0		15	26	22		82	21	103	18		
5	54.0	62.0	108.0		28	46	36		94	19	113	25		
6	48.0	64.0	111.0		12	20	18		85	24	109	23		
7	52.0	62.0	117.0		17	49	38		88	18	106	23		
8	48.0	60.0	109.0		13	34	29		84	19	103	14		
9	50.0	65.0	106.0		18	24	28		87	16	103	31		
10	50.0	65.0	113.0		13	41	34		89	16	105	33		
11	52.0	62.0	112.0		20	35	34		82	19	101	22		
12	55.0	65.0	104.0		22	32	25		92	16	108	24		○
13	58.0	65.0	104.0		26	39	34		90	21	111	26		
14	54.0	61.0	112.0		28	46	28		84	19	103	22		
15	54.0	62.0	109.0		25	40	33		89	12	101	25		○
16	54.0	66.0	103.0		40	42	33		91	16	107	22		
17	50.0	57.0	110.0		9	11	10		82	18	100	9		
18	58.0	65.0	110.0		28	28	20		86	19	105	21		
19	56.0	64.0	104.0		24	25	24		90	15	105	17		
20	60.0	66.0	108.0		22	25	38		89	19	108	29		
平均	52.3	63.0	109.3		21.6	34.5	29.3		87.7	18.3	105.9	24.5		

葉色	/		/		/	
----	---	--	---	--	---	--

坪刈株数	40	欠3
------	----	----

月/日	項目	/	/	/	/
いもち病	数				
	程度				
紋 枯 病	数				
	程度				
	数				
	程度				
	数				
	程度				

月/日	項目	/	/	/	/
	ヒメトビウンカ	匹			
	セジロウンカ	匹			
	トビイロウンカ	匹			
	ツマグロヨコバイ	匹			
	カメムシ類	匹			
		匹			
		匹			
		匹			

※病害数は25株中の発病株数を記入。病害程度は株全体から甚 (100~76) ・多 (75~51) ・中 (50~26) ・少 (25~1) ・無 (0%) で判断。

※害虫は、すくい取り10回振り (ウンカ類) ・20回振り (カメムシ類) の成虫・幼虫数計を記入。

備考 : ※ 雑草、水管理、土質、還元状態や肥料・農薬等耕種概要など特記事項を記入

※稈長と全長は8月27日に再調査実施。

2026年度 水稻生育・収量調査野帳

設置場所	青垣町沢野	面積	5.4	前作
担当農家		品種	夢たんば	区設定
耕種概要	播 種 / 代かき / 田植え	5月6日		

項目	草丈 (cm)				分げつ (本)				収穫期調査日 : 8/25 (実坪刈実施日 : 8/25) 条間 : 28cm 株間 : 25cm					
	①	②	③	④	①	②	③	④	稈長	穂長	全長	穂数	生葉数	平均穂数 代表株
月日	6/16	6/30	7/28	/	6/16	6/30	7/28	/						
1	56.0	52.0	95.0		30	25	23		79	21	100	18		
2	49.0	57.0	94.0		18	19	13		78	23	101	17		
3	53.0	55.0	101.0		22	29	19		80	21	101	20		
4	49.0	50.0	92.0		24	21	19		75	19	94	16		
5	51.0	53.0	93.0		26	30	26		78	19	97	15		
6	51.0	55.0	100.0		29	28	24		83	21	104	14		
7	50.0	52.0	90.0		28	30	23		77	22	99	15		○
8	49.0	55.0	94.0		24	18	17		79	18	97	12		
9	49.0	54.0	98.0		25	32	22		75	17	92	17		
10	52.0	55.0	94.0		27	23	23		79	18	97	11		
11	54.0	54.0	93.0		19	29	24		78	17	95	25		
12	48.0	54.0	93.0		27	25	19		79	14	93	20		
13	49.0	56.0	99.0		19	22	15		77	21	98	16		
14	47.0	56.0	91.0		27	23	12		74	21	95	14		
15	48.0	54.0	100.0		29	31	18		82	21	103	14		
16	50.0	58.0	101.0		26	23	23		76	23	99	18		
17	52.0	56.0	95.0		21	33	26		77	23	100	15		
18	51.0	56.0	97.0		19	23	20		77	20	97	12		
19	47.0	55.0	95.0		18	26	22		80	19	99	16		
20	49.0	56.0	95.0		21	29	28		80	17	97	16		
平均	50.2	54.7	95.5		24.0	26.0	20.8		78.2	19.8	97.9	16.1		

葉色 / / / /

坪刈株数 48 欠0

月/日	項目	/	/	/	/
いもち病	数				
	程度				
紋 枯 病	数				
	程度				
	数				
	程度				
	数				
	程度				

月/日	項目	/	/	/	/
	ヒメトビウンカ	匹			
	セジロウンカ	匹			
	トビイロウンカ	匹			
	ツマグロヨコバイ	匹			
	カメムシ類	匹			
		匹			
		匹			
		匹			

※病害数は25株中の発病株数を記入。病害程度は株全体から甚 (100~76) ・多 (75~51) ・中 (50~26) ・少 (25~1) ・無 (0%) で判断。

※害虫は、すくい取り10回振り (ウンカ類) ・20回振り (カメムシ類) の成虫・幼虫数計を記入。

備考 : ※ 雑草、水管理、土質、還元状態や肥料・農薬等耕種概要など特記事項を記入

7/28ごま葉枯れ少発生

2026年度 水稻生育・収量調査野帳

設置場所	青垣町東芦田	面積	18.9	前作
担当農家		品種	一般コシヒカリ	
耕種概要	播 種 / 代かき / 田植え	5月10日	区 設定	

項目	草丈 (cm)				分げつ (本)				収穫期調査日 : 8/25 (実坪刈実施日 : 8/25) 条間 : 30cm 株間 : 21cm					
	①	②	③	④	①	②	③	④	稈長	穂長	全長	穂数	生葉数	平均穂数 代表株
月日	6/16	6/30	7/28	/	6/16	6/30	7/28	/						
1	46.0	60.0	104.0		24	35	35		80	21	101	34		
2	46.0	59.0	107.0		12	17	13		83	21	104	14		
3	45.0	57.0	102.0		20	22	18		81	19	100	18		
4	44.0	60.0	99.0		26	25	18		82	18	100	21		
5	44.0	57.0	105.0		24	24	21		79	16	95	21		
6	47.0	62.0	99.0		24	27	22		77	21	98	22		
7	44.0	61.0	98.0		14	16	12		81	17	98	12		
8	44.0	57.0	106.0		21	22	17		81	19	100	18		
9	42.0	59.0	99.0		24	25	16		81	18	99	18		
10	46.0	59.0	96.0		20	36	16		81	16	97	22		
11	41.0	58.0	102.0		14	27	22		80	16	96	17		
12	42.0	56.0	100.0		25	26	18		79	20	99	13		○
13	44.0	59.0	104.0		21	23	24		78	18	96	21		
14	42.0	59.0	108.0		24	21	22		85	17	102	19		
15	47.0	60.0	103.0		24	25	18		73	21	94	17		
16	45.0	61.0	102.0		21	24	18		79	20	99	19		
17	46.0	63.0	101.0		32	34	28		80	22	102	24		
18	47.0	58.0	104.0		15	20	16		81	22	103	12		
19	44.0	60.0	99.0		32	30	24		75	19	94	22		
20	42.0	54.0	99.0		26	27	18		74	19	93	18		
平均	44.4	59.0	101.9		22.2	25.3	19.8		79.5	19.0	98.5	19.1		

葉色	/		/		/	
----	---	--	---	--	---	--

坪刈株数	53	欠1
------	----	----

月/日	項目	/	/	/	/
いもち病	数				
	程度				
紋 枯 病	数				
	程度				
	数				
	程度				
	数				
	程度				

月/日	項目	/	/	/	/
	ヒメトビウンカ	匹			
	セジロウンカ	匹			
	トビイロウンカ	匹			
	ツマグロヨコバイ	匹			
	カメムシ類	匹			
		匹			
		匹			
		匹			

※病害数は25株中の発病株数を記入。病害程度は株全体から甚 (100~76) ・多 (75~51) ・中 (50~26) ・少 (25~1) ・無 (0%) で判断。

※害虫は、すくい取り10回振り (ウンカ類) ・20回振り (カメムシ類) の成虫・幼虫数計を記入。

備考 : ※ 雑草、水管理、土質、還元状態や肥料・農薬等耕種概要など特記事項を記入

--

2026年度 水稻生育・収量調査野帳

設置場所	市島町上竹田		面積	10.7	前作
担当農家			品種	一般コシヒカリ	
耕種概要	播 種	/	代かき	/	田植え 5月9日
			区 設定		

項目	草丈 (cm)				分げつ (本)				収穫期調査日 : 8/25 (実坪刈実施日 : 8/25) 条間 : 30cm 株間 : 25cm					
	①	②	③	④	①	②	③	④	稈長	穂長	全長	穂数	生葉数	平均穂数 代表株
月日	6/16	6/30	7/28	/	6/16	6/30	7/28	/						
1	41.0	57.0	105.0		19	35	37		78	19	97	39		
2	36.0	54.0	103.0		4	10	9		78	23	101	8		
3	44.0	57.0	110.0		20	31	32		78	23	101	29		
4	44.0	58.0	98.0		17	24	24		78	20	98	23		
5	44.0	58.0	103.0		16	23	24		83	18	101	23		
6	44.0	54.0	93.0		23	34	31		81	19	100	32		
7	40.0	55.0	97.0		15	23	21		76	20	96	22		○
8	41.0	54.0	95.0		18	25	23		80	20	100	23		
9	47.0	58.0	106.0		10	19	19		79	19	98	19		
10	43.0	60.0	103.0		10	17	16		78	20	98	16		
11	40.0	51.0	95.0		14	26	25					22		○
12	44.0	57.0	94.0		14	17	15					14		
13	45.0	58.0	99.0		23	34	29					29		
14	44.0	56.0	95.0		22	36	32					30		
15	43.0	54.0	99.0		7	9	13					13		
16	43.0	57.0	100.0		22	33	29					26		
17	42.0	52.0	94.0		16	26	23					23		
18	44.0	64.0	97.0		8	14	14					11		
19	45.0	53.0	100.0		27	34	34					31		
20	47.0	59.0	100.0		16	22	21					17		
平均	43.1	56.3	99.3		16.1	24.6	23.6		78.9	20.1	99.0	22.5		

葉色	/		/		/	
----	---	--	---	--	---	--

坪刈株数	37	欠5
------	----	----

月/日	項目	/	/	/	/
いもち病	数				
	程度				
紋 枯 病	数				
	程度				
	数				
	程度				
	数				
	程度				

月/日	項目	/	/	/	/
	ヒメトビウンカ	匹			
	セジロウンカ	匹			
	トビイロウンカ	匹			
	ツマグロヨコバイ	匹			
	カメムシ類	匹			
		匹			
		匹			
		匹			

※病害数は25株中の発病株数を記入。病害程度は株全体から甚 (100~76) ・多 (75~51) ・中 (50~26) ・少 (25~1) ・無 (0%) で判断。

※害虫は、すくい取り10回振り (ウンカ類) ・20回振り (カメムシ類) の成虫・幼虫数計を記入。

備考 : ※ 雑草、水管理、土質、還元状態や肥料・農薬等耕種概要など特記事項を記入

--

2026年度 水稻生育・収量調査野帳

設置場所	市島町乙河内		面積	20	前作	夢たんば
担当農家			品種	夢たんば		
耕種概要	播 種	/	代かき	/	田植え	4/26
				区 設定		

項目	草丈 (cm)				分けつ (本)				収穫期調査日 : 8/18 (実坪刈実施日 : 8/18) 条間 : 30cm 株間 : 23cm					
	①	②	③	④	①	②	③	④	稈長	穂長	全長	穂数	生葉数	平均穂数 代表株
月日	6/16	6/30	7/28	/	6/16	6/30	7/28	/						
1	52.0	72.0	107.0		18	27	28		85	21	106	27		
2	48.0	74.0	103.0		6	11	10		83	19	102	10		
3	53.0	73.0	105.0		19	28	28		87	19	106	31		
4	44.0	67.0	102.0		12	15	16		85	20	105	15		
5	57.0	72.0	104.0		28	33	28		87	19	106	32		
6	47.0	65.0	102.0		20	28	26		84	18	102	25		
7	47.0	69.0	99.0		5	15	11		82	20	102	11		
8	54.0	73.0	108.0		11	22	19		86	20	106	18		
9	51.0	71.0	109.0		32	38	37		85	21	106	37		
10	51.0	66.0	105.0		17	24	26		87	19	106	25		
11	49.0	72.0	107.0		18	19	23		87	20	107	21		○
12	51.0	73.0	110.0		22	30	36		88	20	108	36		
13	52.0	66.0	104.0		6	11	12		82	21	103	12		
14	47.0	71.0	109.0		17	30	31		93	19	112	26		
15	53.0	70.0	108.0		19	32	36		89	20	109	28		
16	54.0	71.0	108.0		18	32	31		86	20	106	31		
17	55.0	71.0	100.0		12	14	14		82	22	104	13		
18	45.0	70.0	106.0		12	22	28		87	20	107	22		○
19	51.0	71.0	105.0		15	28	22		91	20	111	18		
20	52.0	72.0	106.0		13	22	23		87	18	105	19		
平均	50.7	70.5	105.4		16.0	24.1	24.3		86.2	19.8	106.0	22.9		

葉色	/		/		/	
----	---	--	---	--	---	--

坪刈株数	53	欠○
------	----	----

月/日	項目	/	/	/	/
いもち病	数				
	程度				
紋 枯 病	数				
	程度				
	数				
	程度				
	数				
	程度				

月/日	項目	/	/	/	/
	ヒメトビウンカ	匹			
	セジロウンカ	匹			
	トビイロウンカ	匹			
	ツマグロヨコバイ	匹			
	カメムシ類	匹			
		匹			
		匹			
		匹			

※病害数は25株中の発病株数を記入。病害程度は株全体から甚 (100~76) ・多 (75~51) ・中 (50~26) ・少 (25~1) ・無 (0%) で判断。

※害虫は、すくい取り10回振り (ウンカ類) ・20回振り (カメムシ類) の成虫・幼虫数計を記入。

備考 : ※ 雑草、水管理、土質、還元状態や肥料・農薬等耕種概要など特記事項を記入

--

2026年度 水稻生育・収量調査野帳

設置場所	春日町多利			面積	19.9	前作
担当農家				品種	一般コシヒカリ	
耕種概要	播 種	/	代かき	/	田植え	5月5日
				区 設定		

項目	草丈 (cm)				分げつ (本)				収穫期調査日 : 8/25 (実坪刈実施日 : 8/25) 条間 : 30cm 株間 : 23cm					
	①	②	③	④	①	②	③	④	稈長	穂長	全長	穂数	生葉数	平均穂数 代表株
月日	6/16	6/30	7/28	/	6/16	6/30	7/28	/						
1	50.0	71.0	108.0		24	31	30		84	18	102	26		
2	52.0	69.0	113.0		24	37	26		90	20	110	27		
3	49.0	67.0	105.0		30	31	27		90	18	108	28		
4	55.0	71.0	111.0		33	43	34		85	20	105	27		
5	51.0	67.0	108.0		26	31	23		88	19	107	34		
6	54.0	68.0	106.0		18	30	26		87	21	108	25		
7	45.0	67.0	103.0		9	21	14		83	20	103	26		
8	50.0	68.0	103.0		21	27	21		83	21	104	8		
9	55.0	67.0	104.0		24	28	25		85	20	105	17		
10	53.0	68.0	108.0		22	31	21		85	21	106	21		
11	52.0	67.0	106.0		21	34	21					25		
12	51.0	65.0	105.0		20	24	13					21		
13	53.0	67.0	107.0		14	34	23					20		
14	52.0	67.0	108.0		16	17	14					13		○
15	53.0	67.0	106.0		23	24	25					12		○
16	52.0	67.0	105.0		20	20	24					20		
17	49.0	64.0	103.0		25	18	20					22		
18	52.0	63.0	106.0		21	20	21					20		
19	51.0	62.0	103.0		20	17	19					20		
20	51.0	61.0	102.0		20	15	15					19		
平均	51.5	66.7	106.0		21.6	26.7	22.1		86.0	19.8	105.8	21.6		

葉色	/		/		/	
----	---	--	---	--	---	--

坪刈株数	35	欠2
------	----	----

月/日	項目	/	/	/	/
いもち病	数				
	程度				
紋 枯 病	数				
	程度				
	数				
	程度				
	数				
	程度				

月/日	項目	/	/	/	/
	ヒメトビウンカ	匹			
	セジロウンカ	匹			
	トビイロウンカ	匹			
	ツマグロヨコバイ	匹			
	カメムシ類	匹			
		匹			
		匹			
		匹			

※病害数は25株中の発病株数を記入。病害程度は株全体から甚 (100~76) ・多 (75~51) ・中 (50~26) ・少 (25~1) ・無 (0%) で判断。

※害虫は、すくい取り10回振り (ウンカ類) ・20回振り (カメムシ類) の成虫・幼虫数計を記入。

備考 : ※ 雑草、水管理、土質、還元状態や肥料・農薬等耕種概要など特記事項を記入

--

2026年度 水稻生育・収量調査野帳

設置場所	春日町稲塚			面積	19.4	前作	コシ(夢たんば)
担当農家				品種	夢たんば		
耕種概要	播 種	/	代かき	/	田植え	5月1日	
				区 設定			

項目	草丈 (cm)				分げつ (本)				収穫期調査日 : 8/25 (実坪刈実施日 : 8/25) 条間 : 29cm 株間 : 28cm					
	①	②	③	④	①	②	③	④	稈長	穂長	全長	穂数	生葉数	平均穂数 代表株
月日	6/16	6/30	7/28	/	6/16	6/30	7/28	/						
1	48.0	65.0	117.0		20	33	34		92	21	113	35		
2	48.0	66.0	118.0		16	29	27		90	19	109	27		
3	49.0	67.0	116.0		19	27	26		93	21	114	26		
4	54.0	68.0	112.0		16	28	27		96	14	110	26		
5	54.0	64.0	113.0		22	32	36		97	12	109	35		
6	50.0	65.0	115.0		17	26	24		88	18	106	26		
7	47.0	70.0	112.0		22	25	26		88	21	109	26		
8	57.0	69.0	117.0		23	31	29		93	21	114	32		
9	49.0	71.0	114.0		22	31	27		90	20	110	30		○
10	52.0	67.0	119.0		20	29	31		89	19	108	30		○
11	51.0	67.0	116.0		22	34	31		99	17	116	34		
12	47.0	68.0	116.0		15	27	26		92	23	115	36		
13	52.0	68.0	123.0		18	29	29		96	21	117	29		
14	47.0	68.0	123.0		18	27	26		86	21	107	26		
15	54.0	69.0	120.0		23	37	35		89	23	112	37		
16	54.0	70.0	119.0		17	39	38		90	22	112	38		
17	50.0	68.0	120.0		24	36	36		91	19	110	34		
18	52.0	68.0	124.0		24	25	33		97	19	116	32		
19	54.0	68.0	120.0		17	38	36		88	21	109	34		
20	54.0	70.0	121.0		13	23	19		88	24	112	21		
平均	51.2	67.8	117.8		19.4	30.3	29.8		91.6	19.8	111.4	30.7		

葉色	/		/		/	
----	---	--	---	--	---	--

坪刈株数	45	欠0
------	----	----

月/日	項目	/	/	/	/
いもち病	数				
	程度				
紋 枯 病	数				
	程度				
	数				
	程度				
	数				
	程度				

月/日	項目	/	/	/	/
	ヒメトビウンカ	匹			
	セジロウンカ	匹			
	トビイロウンカ	匹			
	ツマグロヨコバイ	匹			
	カメムシ類	匹			
		匹			
		匹			
		匹			

※病害数は25株中の発病株数を記入。病害程度は株全体から甚 (100~76) ・多 (75~51) ・中 (50~26) ・少 (25~1) ・無 (0%) で判断。

※害虫は、すくい取り10回振り (ウンカ類) ・20回振り (カメムシ類) の成虫・幼虫数計を記入。

備考 : ※ 雑草、水管理、土質、還元状態や肥料・農薬等耕種概要など特記事項を記入

--