

黒豆生育並びに病害虫発生状況

2025/8/18

		柏原	氷上	山南	青垣	市島	春日	平均
主茎長(cm)	7月26日	29.5	40.0	42.0	26.5	46.1	40.3	37.4
	8月16日	73.8	65.0	72.9	53.0	78.8	80.1	70.6
主茎節数(節)	7月26日	12.7	11.0	12.3	9.8	12.2	13.7	12.0
	8月16日	20.4	15.9	15.6	11.0	13.8	15.1	15.3

調査地点	病害						虫害								
	ウイルス病 (%)	さび病 (%)	べと病 (%)	葉焼病 (%)	その他 (%)	立枯病 (%)	ハスモンヨトウ(頭/株)	フキノメイガ(%)	サヤムシカ*(%)	カメムシ類 (頭/株)	鱗翅目 幼虫(頭/株)	フタスジヒメハムシ (%)	その他	ハダニ (頭/小葉)	アブラムシ(頭/小葉)
柏原	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1	0.15	0	0.05	0	0
氷上	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0.25	0	0.1	0	0	0
山南	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2	0	0	0.05	0	0
青垣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.15	0	0.25	0	0.02	0
市島	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.05	0	0.3	0	0	0
春日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.5	0	0.25	0	2	0.2
平均	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.5	0.0	0.2	0.0	0.3	0.0

【コメント】