

黒豆生育並びに病害虫発生状況

2024/8/16

		柏原	氷上	山南	青垣	市島	春日	平均
主茎長(cm)	7月26日	37.4	34.3	32.9	23.1	22.7	28.2	29.8
	8月16日	70.3	59.3	60.9	52.6	29.1	47.9	53.4
主茎節数(節)	7月26日	13.6	9.3	12.1	7.8	6.6	9.3	9.8
	8月16日	19.5	15.7	19.0	14.0	11.6	14.6	15.7

調査地点	病害						虫害								
	ウイルス病 (%)	さび病 (%)	べと病 (%)	葉焼病 (%)	その他 (%)	立枯病 (%)	ハスモンヨ ウ(頭/ 株)	フキノメイ カ(%)	サヤマシガ(%)	カメムシ類 (頭/株)	鱗翅目 幼虫(頭/ 株)	フタスジヒ メハムシ (%)	その他	ハダニ (頭/小 葉)	アブラ ムシ(頭/ 小葉)
柏原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
氷上	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
山南	0	10	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
青垣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市島	0	0	0	0	0	4	0	0	5	1.4	0.05	1.65	0	0	0.04
春日	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0.35	0	0.1	0	0	0.1
平均	0.0	1.7	2.5	0.0	0.0	0.7	0.0	0.8	1.7	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0

【コメント】

病害は、さび病、べと病、立枯性病害(茎疫病)の発生が見られた。前2者は進展が止まっていた。
茎疫病は発生が1ほ場のみであったが、ほ場全体に発生が見られた。
虫害はカメムシ類やフタスジヒメハムシの発生が多かった。カメムシ類は花や莢を落下させる害が多いので、今後、基幹防除を徹底して実施する必要がある。