

黒豆生育並びに病害虫発生状況

2026/7/28

	柏原	氷上	山南	青垣	市島	春日	平均
主茎長(cm)	33.9	47.1	8.1	24.8	25.0	28.1	27.8
主茎節数(節)	12.5	14.2	3.0	14.2	8.5	9.6	10.3

調査地点	病害						虫害								
	ウイルス病 (%)	さび病 (%)	べと病 (%)	葉焼病 (%)	その他 (%)	立枯病 (%)	ハスモンヨトウ(頭/株)	フキノメイガ(%)	サヤムシガ(%)	カメムシ類 (頭/株)	鱗翅目 幼虫(頭/株)	フタスジヒメハムシ (%)	その他	ハダニ (頭/小葉)	アブラムシ(頭/小葉)
柏原	0	0	0	0	0	0	0	40	15	0.1	0	0.2	0	0.08	0.04
氷上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
山南	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
青垣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市島	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.15	0	0	0
春日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3	0	0	0.04
平均	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.67	2.50	0.02	0.00	0.11	0.00	0.01	0.01

【コメント】