

2024年度 水稻生育・収量調査野帳

設置場所	柏原町拳田タカシボラ	面積	28.8	前作
担当農家		品種	夢たんば	区 設定
耕種概要	播 種 / 代かき / 田植え			

項目	草丈 (cm)				分けつ (本)				収穫期調査日 : 8/30 (実坪刈実施日 : 8/30) 条間 : 株間 :					
	①	②	③	④	①	②	③	④						
月日	6/14	6/28	7/26	/	6/14	6/28	7/26	/	稈長	穂長	全長	穂数	生葉数	平均穂数 代表株
1	37.0	56.0			14	37								
2	35.0	60.0			14	27								
3	36.0	60.0			22	37								
4	40.0	57.0			16	34								
5	39.0	56.0			21	29								
6	38.0	55.0			10	18								
7	41.0	58.0			8	17								
8	38.0	56.0			22	38								
9	40.0	57.0			19	32								
10	41.0	60.0			16	30								
11	40.0	38.0			20	35								
12	37.0	59.0			21	36								
13	40.0	61.0			15	27								
14	40.0	60.0			13	28								
15	42.0	59.0			16	32								
16	41.0	56.0			14	27								
17	42.0	59.0			11	23								
18	40.0	59.0			15	32								
19	40.0	56.0			198	28								
20	40.0	58.0			20	32								
平均	39.4	57.0			25.3	30.0			#DIV/0!					

葉色	/		/		/	
----	---	--	---	--	---	--

坪刈株数	
------	--

月/日	項目	/	/	/	/
いもち病	数				
	程度				
紋 枯 病	数				
	程度				
	数				
	程度				
	数				
	程度				

月/日	項目	/	/	/	/
	ヒメトビウンカ	匹			
	セジロウンカ	匹			
	トビイロウンカ	匹			
	ツマグロヨコバイ	匹			
	カメムシ類	匹			
		匹			
		匹			
		匹			

※病害数は25株中の発病株数を記入。病害程度は株全体から甚（100～76）・多（75～51）・中（50～26）・少（25～1）・無（0％）で判断。
※害虫は、すくい取り10回振り（ウンカ類）・20回振り（カメムシ類）の成虫・幼虫数計を記入。

備考：※ 雑草、水管理、土質、還元状態や肥料・農薬等耕種概要など特記事項を記入

2024年度 水稻生育・収量調査野帳

設置場所	柏原町下小倉マツノモト	面積	15.4	前作
担当農家		品種	一般 コシヒカリ	区 設定
耕種概要	播 種 / 代かき / 田植え			

項目	草丈 (cm)				分けつ (本)				収穫期調査日 : 8/30 (実坪刈実施日 : 8/30) 条間 : 株間 :					
	①	②	③	④	①	②	③	④						
月日	6/14	6/28	7/26	/	6/14	6/28	7/26	/	稈長	穂長	全長	穂数	生葉数	平均穂数 代表株
1	30.5	60.0			14	21								
2	29.5	55.0			8	15								
3	29.0	57.0			16	25								
4	32.0	63.0			9	19								
5	27.0	57.0			17	26								
6	30.0	56.0			11	26								
7	29.5	52.0			10	19								
8	30.5	56.0			15	29								
9	29.5	60.0			12	21								
10	28.0	58.0			14	22								
11	29.0	55.0			20	23								
12	29.0	58.0			16	23								
13	27.5	60.0			8	15								
14	27.0	56.0			19	28								
15	28.0	57.0			19	28								
16	28.0	55.0			19	23								
17	29.0	59.0			16	32								
18	28.0	56.0			14	24								
19	27.0	54.0			13	24								
20	28.5	58.0			11	28								
平均	28.8	57.1			14.1	23.6			#DIV/0!					

葉色	/		/		/	
----	---	--	---	--	---	--

坪刈株数	
------	--

月/日	項目	/	/	/	/
いもち病	数				
	程度				
紋 枯 病	数				
	程度				
	数				
	程度				
	数				
	程度				

月/日	項目	/	/	/	/
	ヒメトビウンカ	匹			
	セジロウンカ	匹			
	トビイロウンカ	匹			
	ツマグロヨコバイ	匹			
	カメムシ類	匹			
		匹			
		匹			
		匹			

※病害数は25株中の発病株数を記入。病害程度は株全体から甚（100～76）・多（75～51）・中（50～26）・少（25～1）・無（0%）で判断。
※害虫は、すくい取り10回振り（ウンカ類）・20回振り（カメムシ類）の成虫・幼虫数計を記入。

備考：※ 雑草、水管理、土質、還元状態や肥料・農薬等耕種概要など特記事項を記入

2024年度 水稻生育・収量調査野帳

設置場所	山南町村森カキジマ	面積	32.6	前作
担当農家		品種	夢たんば	区 設定
耕種概要	播 種 / 代かき / 田植え			

項目	草丈 (cm)				分けつ (本)				収穫期調査日 : 8/30 (実坪刈実施日 : 8/30) 条間 : 株間 :					
	①	②	③	④	①	②	③	④						
月日	6/14	6/28	7/26	/	6/14	6/28	7/26	/	稈長	穂長	全長	穂数	生葉数	平均穂数 代表株
1	36.0	57.0			15	22								
2	36.0	55.0			8	17								
3	34.5	56.0			17	20								
4	37.0	56.0			22	27								
5	38.5	59.0			19	35								
6	37.0	59.0			16	29								
7	35.5	58.0			25	33								
8	35.5	55.0			15	26								
9	36.5	58.0			23	29								
10	39.5	60.0			23	33								
11	39.5	62.0			20	32								
12	36.0	62.0			12	20								
13	39.0	59.0			25	33								
14	38.0	56.0			15	27								
15	38.0	56.0			19	28								
16	37.5	53.0			13	20								
17	35.0	51.0			28	27								
18	34.0	56.0			23	34								
19	34.0	57.0			21	28								
20	36.0	55.0			16	24								
平均	36.7	57.0			18.8	27.2			#DIV/0!					

葉色	/		/		/	
----	---	--	---	--	---	--

坪刈株数	
------	--

月/日	項目	/	/	/	/
いもち病	数				
	程度				
紋 枯 病	数				
	程度				
	数				
	程度				
	数				
	程度				

月/日	項目	/	/	/	/
	ヒメトビウンカ	匹			
	セジロウンカ	匹			
	トビイロウンカ	匹			
	ツマグロヨコバイ	匹			
	カメムシ類	匹			
		匹			
		匹			
		匹			

※病害数は25株中の発病株数を記入。病害程度は株全体から甚（100～76）・多（75～51）・中（50～26）・少（25～1）・無（0％）で判断。
※害虫は、すくい取り10回振り（ウンカ類）・20回振り（カメムシ類）の成虫・幼虫数計を記入。

備考：※ 雑草、水管理、土質、還元状態や肥料・農薬等耕種概要など特記事項を記入

2024年度 水稻生育・収量調査野帳

設置場所	山南町奥野々字池ノ下	面積	19.7	前作
担当農家		品種	一般コシヒカリ	
耕種概要	播 種 / 代かき / 田植え	区設定		

項目	草丈 (cm)				分けつ (本)				収穫期調査日 : 8/30 (実坪刈実施日 : 8/30) 条間 : 株間 :					
	①	②	③	④	①	②	③	④						
月日	6/14	6/28	7/26	/	6/14	6/28	7/26	/	稈長	穂長	全長	穂数	生葉数	平均穂数 代表株
1	29.0	49.0			17	16								
2	30.0	51.0			13	12								
3	28.5	53.0			13	13								
4	28.0	49.0			5	8								
5	30.5	49.0			14	20								
6	29.0	53.0			10	14								
7	27.5	50.0			13	15								
8	28.0	50.0			16	20								
9	28.5	52.0			11	21								
10	28.0	54.0			8	14								
11	30.0	55.0			9	19								
12	27.5	52.0			14	15								
13	29.0	54.0			12	16								
14	28.5	52.0			7	18								
15	27.5	53.0			3	8								
16	30.0	54.0			12	18								
17	27.0	55.0			5	17								
18	28.0	57.0			9	17								
19	27.0	56.0			10	16								
20	27.0	55.0			11	18								
平均	28.4	52.7			10.6	15.8			#DIV/0!					

葉色	/		/		/	
----	---	--	---	--	---	--

坪刈株数	
------	--

月/日	項目	/	/	/	/
いもち病	数				
	程度				
紋 枯 病	数				
	程度				
	数				
	程度				
	数				
	程度				

月/日	項目	/	/	/	/
	ヒメトビウンカ	匹			
	セジロウンカ	匹			
	トビイロウンカ	匹			
	ツマグロヨコバイ	匹			
	カメムシ類	匹			
		匹			
		匹			
		匹			

※病害数は25株中の発病株数を記入。病害程度は株全体から甚（100～76）・多（75～51）・中（50～26）・少（25～1）・無（0%）で判断。
※害虫は、すくい取り10回振り（ウンカ類）・20回振り（カメムシ類）の成虫・幼虫数計を記入。

備考：※ 雑草、水管理、土質、還元状態や肥料・農薬等耕種概要など特記事項を記入

2024年度 水稻生育・収量調査野帳

設置場所	水上町南油良オオギリ	面積	28.8	前作
担当農家		品種	夢たんば	区 設定
耕種概要	播 種 / 代かき / 田植え			

項目	草丈 (cm)				分けつ (本)				収穫期調査日： 8/30 (実坪刈実施日： 8/30) 条間： 株間：					
	①	②	③	④	①	②	③	④						
月日	6/14	6/30	7/26	/	6/14	6/30	7/26	/	稈長	穂長	全長	穂数	生葉数	平均穂数 代表株
1	30.0	57.0			8	15								
2	30.0	58.0			7	13								
3	29.0	55.0			9	14								
4	26.0	58.0			7	11								
5	29.0	55.0			11	16								
6	30.0	57.0			12	11								
7	28.0	53.0			14	16								
8	27.0	52.0			3	15								
9	29.0	55.0			6	6								
10	28.0	50.0			18	9								
11	28.0	55.0			21	15								
12	28.0	51.0			12	19								
13	30.0	56.0			11	16								
14	31.0	57.0			12	13								
15	27.0	50.0			12	13								
16	29.0	50.0			12	18								
17	29.0	54.0			12	20								
18	29.0	58.0			12	16								
19	29.0	58.0			8	13								
20	27.0	56.0			12	17								
平均	28.7	54.8			11.0	14.3			#DIV/0!					

葉色	/		/		/	
----	---	--	---	--	---	--

坪刈株数	
------	--

月/日	項目	/	/	/	/
いもち病	数				
	程度				
紋 枯 病	数				
	程度				
	数				
	程度				
	数				
	程度				

月/日	項目	/	/	/	/
	ヒメトビウンカ	匹			
	セジロウンカ	匹			
	トビイロウンカ	匹			
	ツマグロヨコバイ	匹			
	カメムシ類	匹			
		匹			
		匹			
		匹			

※病害数は25株中の発病株数を記入。病害程度は株全体から甚（100～76）・多（75～51）・中（50～26）・少（25～1）・無（0％）で判断。
※害虫は、すくい取り10回振り（ウンカ類）・20回振り（カメムシ類）の成虫・幼虫数計を記入。

備考：※ 雑草、水管理、土質、還元状態や肥料・農薬等耕種概要など特記事項を記入

2024年度 水稻生育・収量調査野帳

設置場所	水上町小野フジシロ	面積	23.5	前作
担当農家		品種	一般コシヒカリ	
耕種概要	播 種 / 代かき / 田植え	区 設定		

項目	草丈 (cm)				分けつ (本)				収穫期調査日 : 8/30 (実坪刈実施日 : 8/30) 条間 : 株間 :					
	①	②	③	④	①	②	③	④						
月日	6/14	6/28	7/26	/	6/14	6/28	7/26	/	稈長	穂長	全長	穂数	生葉数	平均穂数 代表株
1	35.0	58.0			29	34								
2	33.0	60.0			33	30								
3	36.0	60.0			21	19								
4	32.0	56.0			18	26								
5	34.0	56.0			21	26								
6	34.0	56.0			33	27								
7	35.0	55.0			22	25								
8	36.5	55.0			26	35								
9	35.5	55.0			22	27								
10	34.5	57.0			15	20								
11	34.0	58.0			26	29								
12	35.0	57.0			24	24								
13	33.5	58.0			4	29								
14	32.0	63.0			13	24								
15	29.5	60.0			13	26								
16	32.0	59.0			18	27								
17	33.0	60.0			18	23								
18	31.5	59.0			22	20								
19	32.0	59.0			20	27								
20	35.0	58.0			28	21								
平均	33.7	58.0			21.3	26.0			#DIV/0!					

葉色	/		/		/	
----	---	--	---	--	---	--

坪刈株数	
------	--

月/日	項目	/	/	/	/
いもち病	数				
	程度				
紋 枯 病	数				
	程度				
	数				
	程度				
	数				
	程度				

月/日	項目	/	/	/	/
	ヒメトビウンカ	匹			
	セジロウンカ	匹			
	トビイロウンカ	匹			
	ツマグロヨコバイ	匹			
	カメムシ類	匹			
		匹			
		匹			
		匹			

※病害数は25株中の発病株数を記入。病害程度は株全体から甚（100～76）・多（75～51）・中（50～26）・少（25～1）・無（0％）で判断。
※害虫は、すくい取り10回振り（ウンカ類）・20回振り（カメムシ類）の成虫・幼虫数計を記入。

備考：※ 雑草、水管理、土質、還元状態や肥料・農薬等耕種概要など特記事項を記入

2024年度 水稻生育・収量調査野帳

設置場所	青垣町東芦田下島地	面積	11.8	前作
担当農家		品種	夢たんば	区 設定
耕種概要	播 種 / 代かき / 田植え			

項目	草丈 (cm)				分けつ (本)				収穫期調査日： 8/30 (実坪刈実施日： 8/30) 条間： 株間：					
	①	②	③	④	①	②	③	④						
月日	6/14	6/28	7/26	/	6/14	6/28	7/26	/	稈長	穂長	全長	穂数	生葉数	平均穂数 代表株
1	31.0	62.0			9	30								
2	28.0	57.0			13	29								
3	28.0	60.0			12	26								
4	33.0	63.0			6	23								
5	34.0	68.0			15	29								
6	31.0	62.0			14	33								
7	29.0	58.0			13	26								
8	33.0	63.0			15	27								
9	30.0	61.0			17	27								
10	29.0	60.0			16	27								
11	35.0	66.0			17	29								
12	32.0	67.0			15	25								
13	35.0	61.0			10	17								
14	36.0	61.0			25	28								
15	32.0	65.0			20	24								
16	33.0	61.0			17	29								
17	30.0	68.0			15	25								
18	34.0	63.0			15	28								
19	31.0	66.0			24	33								
20	34.0	62.0			14	30								
平均	31.9	62.7			15.1	27.3			#DIV/0!					

葉色	/		/		/	
----	---	--	---	--	---	--

坪刈株数	
------	--

月/日	項目	/	/	/	/
いもち病	数				
	程度				
紋 枯 病	数				
	程度				
	数				
	程度				
	数				
	程度				

月/日	項目	/	/	/	/
	ヒメトビウンカ	匹			
	セジロウンカ	匹			
	トビイロウンカ	匹			
	ツマグロヨコバイ	匹			
	カメムシ類	匹			
		匹			
		匹			
		匹			

※病害数は25株中の発病株数を記入。病害程度は株全体から甚（100～76）・多（75～51）・中（50～26）・少（25～1）・無（0％）で判断。
※害虫は、すくい取り10回振り（ウンカ類）・20回振り（カメムシ類）の成虫・幼虫数計を記入。

備考：※ 雑草、水管理、土質、還元状態や肥料・農薬等耕種概要など特記事項を記入

2024年度 水稻生育・収量調査野帳

設置場所	青垣町東芦田オオヒエダ	面積	28	前作
担当農家		品種	一般コシヒカリ	
耕種概要	播 種 / 代かき / 田植え	区 設定		

項目	草丈 (cm)				分けつ (本)				収穫期調査日 : 8/30 (実坪刈実施日 : 8/30) 条間 : 株間 :					
	①	②	③	④	①	②	③	④						
月日	6/14	6/28	7/26	/	6/14	6/28	7/26	/	稈長	穂長	全長	穂数	生葉数	平均穂数 代表株
1	23.0	59.0			7	19								
2	23.0	59.0			17	33								
3	28.0	62.0			10	27								
4	27.0	62.0			10	30								
5	27.0	61.0			9	24								
6	26.0	62.0			12	23								
7	27.0	60.0			11	28								
8	27.0	59.0			14	27								
9	29.0	63.0			18	27								
10	26.0	59.0			16	26								
11	26.0	62.0			24	30								
12	28.0	57.0			16	22								
13	29.0	59.0			15	22								
14	26.0	62.0			27	33								
15	27.0	59.0			14	24								
16	26.0	65.0			15	27								
17	26.0	58.0			17	31								
18	27.0	60.0			17	23								
19	29.0	63.0			19	31								
20	27.0	60.0			16	23								
平均	26.7	60.6			15.2	26.5			#DIV/0!					

葉色	/		/		/	
----	---	--	---	--	---	--

坪刈株数	
------	--

月/日	項目	/	/	/	/
いもち病	数				
	程度				
紋 枯 病	数				
	程度				
	数				
	程度				
	数				
	程度				

月/日	項目	/	/	/	/
	ヒメトビウンカ	匹			
	セジロウンカ	匹			
	トビイロウンカ	匹			
	ツマグロヨコバイ	匹			
	カメムシ類	匹			
		匹			
		匹			
		匹			

※病害数は25株中の発病株数を記入。病害程度は株全体から甚（100～76）・多（75～51）・中（50～26）・少（25～1）・無（0％）で判断。
※害虫は、すくい取り10回振り（ウンカ類）・20回振り（カメムシ類）の成虫・幼虫数計を記入。

備考：※ 雑草、水管理、土質、還元状態や肥料・農薬等耕種概要など特記事項を記入

2024年度 水稻生育・収量調査野帳

設置場所	市島町上竹田シユク	面積	10.7	前作
担当農家		品種	一般コシヒカリ	
耕種概要	播 種 / 代かき / 田植え	区 設定		

項目	草丈 (cm)				分けつ (本)				収穫期調査日 : 8/30 (実坪刈実施日 : 8/30) 条間 : 株間 :					
	①	②	③	④	①	②	③	④						
月日	6/14	6/28	7/26	/	6/14	6/28	7/26	/	稈長	穂長	全長	穂数	生葉数	平均穂数 代表株
1	33.0	63.0			12	25								
2	38.0	66.0			18	43								
3	38.0	61.0			18	24								
4	36.0	66.0			36	41								
5	37.0	62.0			14	25								
6	37.0	58.0			27	36								
7	33.0	61.0			24	25								
8	38.0	63.0			24	35								
9	37.0	65.0			17	28								
10	37.0	63.0			28	30								
11	36.0	63.0			9	18								
12	38.0	64.0			19	39								
13	35.0	63.0			20	29								
14	34.0	61.0			21	33								
15	35.0	64.0			20	33								
16	34.0	65.0			27	29								
17	37.0	61.0			25	26								
18	37.0	60.0			23	37								
19	36.0	65.0			21	30								
20	33.0	62.0			31	38								
平均	36.0	62.8			21.7	31.2			#DIV/0!					

葉色	/		/		/	
----	---	--	---	--	---	--

坪刈株数	
------	--

月/日	項目	/	/	/	/
いもち病	数				
	程度				
紋 枯 病	数				
	程度				
	数				
	程度				
	数				
	程度				

月/日	項目	/	/	/	/
	ヒメトビウンカ	匹			
	セジロウンカ	匹			
	トビイロウンカ	匹			
	ツマグロヨコバイ	匹			
	カメムシ類	匹			
		匹			
		匹			
		匹			

※病害数は25株中の発病株数を記入。病害程度は株全体から甚（100～76）・多（75～51）・中（50～26）・少（25～1）・無（0％）で判断。
※害虫は、すくい取り10回振り（ウンカ類）・20回振り（カメムシ類）の成虫・幼虫数計を記入。

備考：※ 雑草、水管理、土質、還元状態や肥料・農薬等耕種概要など特記事項を記入

2024年度 水稻生育・収量調査野帳

設置場所	市島町下竹田ハタケダ	面積	28.5	前作	夢たんば
担当農家		品種	夢たんば	区設定	
耕種概要	播種 / 代かき / 田植え				

項目	草丈 (cm)				分けつ (本)				収穫期調査日 : 8/30 (実坪刈実施日 : 8/30) 条間 : 株間 :					
	①	②	③	④	①	②	③	④						
月日	6/14	6/28	7/26	/	6/14	6/28	7/26	/	稈長	穂長	全長	穂数	生葉数	平均穂数 代表株
1	33.0	63.0			17	43								
2	34.0	61.0			24	44								
3	33.0	60.0			18	30								
4	34.0	61.0			22	31								
5	31.0	61.0			21	27								
6	33.0	59.0			24	37								
7	33.0	57.0			23	31								
8	38.0	65.0			17	32								
9	32.0	64.0			11	23								
10	34.0	61.0			9	14								
11	37.0	61.0			25	33								
12	38.0	62.0			21	32								
13	32.0	59.0			15	23								
14	31.0	61.0			12	23								
15	33.0	57.0			28	37								
16	30.0	56.0			17	38								
17	30.0	58.0			23	48								
18	37.0	60.0			19	27								
19	31.0	61.0			19	30								
20	34.0	58.0			18	31								
平均	33.4	60.3			19.2	31.7								

葉色	/	/	/	/
----	---	---	---	---

坪刈株数	
------	--

月/日	項目	/	/	/	/
いもち病	数				
	程度				
紋枯病	数				
	程度				
	数				
	程度				
	数				
	程度				

月/日	項目	/	/	/	/
	ヒメトビウンカ	匹			
	セジロウンカ	匹			
	トビイロウンカ	匹			
	ツマグロヨコバイ	匹			
	カメムシ類	匹			
		匹			
		匹			
		匹			

※病害数は25株中の発病株数を記入。病害程度は株全体から甚（100～76）・多（75～51）・中（50～26）・少（25～1）・無（0％）で判断。
※害虫は、すくい取り10回振り（ウンカ類）・20回振り（カメムシ類）の成虫・幼虫数計を記入。

備考：※ 雑草、水管理、土質、還元状態や肥料・農薬等耕種概要など特記事項を記入

2024年度 水稻生育・収量調査野帳

設置場所	春日町多利	面積	19.9	前作
担当農家		品種	一般コシヒカリ	
耕種概要	播 種 / 代かき / 田植え	区 設定		

項目	草丈 (cm)				分けつ (本)				収穫期調査日 : 8/30 (実坪刈実施日 : 8/30) 条間 : 株間 :					
	①	②	③	④	①	②	③	④						
月日	6/14	6/28	7/26	/	6/14	6/28	7/26	/	稈長	穂長	全長	穂数	生葉数	平均穂数 代表株
1	33.0	62.0			28	29								
2	34.0	61.0			22	23								
3	32.0	66.0			14	25								
4	33.0	62.0			28	30								
5	33.0	64.0			26	31								
6	33.0	60.0			25	27								
7	31.0	61.0			32	41								
8	32.0	62.0			26	32								
9	32.0	62.0			32	45								
10	34.0	64.0			26	40								
11	33.0	63.0			20	38								
12	32.0	62.0			13	29								
13	28.0	58.0			19	27								
14	33.0	62.0			18	32								
15	33.0	64.0			18	31								
16	32.0	68.0			15	24								
17	30.0	62.0			20	32								
18	29.0	62.0			15	28								
19	33.0	64.0			19	36								
20	30.0	63.0			20	30								
平均	32.0	62.6			21.8	31.5								

葉色	/		/		/	
----	---	--	---	--	---	--

坪刈株数	
------	--

月/日	項目	/	/	/	/
いもち病	数				
	程度				
紋 枯 病	数				
	程度				
	数				
	程度				
	数				
	程度				

月/日	項目	/	/	/	/
	ヒメトビウンカ	匹			
	セジロウンカ	匹			
	トビイロウンカ	匹			
	ツマグロヨコバイ	匹			
	カメムシ類	匹			
		匹			
		匹			
		匹			

※病害数は25株中の発病株数を記入。病害程度は株全体から甚（100～76）・多（75～51）・中（50～26）・少（25～1）・無（0％）で判断。

※害虫は、すくい取り10回振り（ウンカ類）・20回振り（カメムシ類）の成虫・幼虫数計を記入。

備考：※ 雑草、水管理、土質、還元状態や肥料・農薬等耕種概要など特記事項を記入

--

2024年度 水稻生育・収量調査野帳

設置場所	春日町野村	面積	21.6	前作	コシ(夢たんば)
担当農家		品種	夢たんば	区設定	
耕種概要	播種 / 代かき / 田植え				

項目	草丈 (cm)				分けつ (本)				収穫期調査日 : 8/30 (実坪刈実施日 : 8/30) 条間 : 株間 :					
	①	②	③	④	①	②	③	④						
月日	6/14	6/28	7/26		6/14	6/28	7/26		稈長	穂長	全長	穂数	生葉数	平均穂数 代表株
1	37.0	65.0			15	18								
2	39.0	70.0			10	24								
3	40.0	62.0			15	20								
4	38.0	73.0			18	22								
5	38.0	63.0			19	19								
6	42.0	72.0			14	22								
7	31.0	63.0			7	8								
8	44.0	71.0			25	26								
9	45.0	68.0			18	20								
10	42.0	76.0			21	13								
11	41.0	70.0			13	21								
12	42.0	67.0			13	12								
13	45.0	70.0			23	18								
14	41.0	67.0			16	19								
15	41.0	65.0			9	12								
16	41.0	64.0			15	14								
17	36.0	70.0			5	7								
18	36.0	67.0			11	14								
19	33.0	64.0			7	9								
20	39.0	67.0			5	7								
平均	39.6	67.7			14.0	16.3								

葉色	/		/		/	
----	---	--	---	--	---	--

坪刈株数	
------	--

月/日	項目	/	/	/	/
いもち病	数				
	程度				
紋枯病	数				
	程度				
	数				
	程度				
	数				
	程度				

月/日	項目	/	/	/	/
	ヒメトビウンカ	匹			
	セジロウンカ	匹			
	トビイロウンカ	匹			
	ツマグロヨコバイ	匹			
	カメムシ類	匹			
		匹			
		匹			
		匹			

※病害数は25株中の発病株数を記入。病害程度は株全体から甚（100～76）・多（75～51）・中（50～26）・少（25～1）・無（0％）で判断。
※害虫は、すくい取り10回振り（ウンカ類）・20回振り（カメムシ類）の成虫・幼虫数計を記入。

備考：※ 雑草、水管理、土質、還元状態や肥料・農薬等耕種概要など特記事項を記入