

2025年度 水稻生育・収量調査野帳

設置場所	柏原町下小倉マツノモト			面積	15.4	前作	
担当農家		品種	一般 コシヒカリ		区 設定		
耕種概要	播 種	/	代かき	/			

項目	草丈 (cm)				分げつ (本)				収穫期調査日 : 8/25 (実坪刈実施日 : 8/25) 条間 : 30cm 株間 : 25cm					
	①	②	③	④	①	②	③	④	稈長	穂長	全長	穂数	生葉数	平均穂数 代表株
月日	6/16	6/30	7/28	/	6/16	6/30	7/28	/						
1	31.0	66.0	107		8	28	31		80	19	99	39		
2	32.0	64.0	98		24	30	25		90	17	107	29		
3	32.0	67.0	97		10	24	23		87	19	106	28		
4	35.0	66.0	104		17	30	25		83	17	100	33		
5	39.0	68.0	99		25	29	32		88	19	107	33		
6	33.0	68.0	100		10	24	26		87	19	106	23		
7	36.0	70.0	102		11	30	29		88	18	106	33		
8	35.0	68.0	102		23	30	28		92	17	109	30		
9	35.0	68.0	101		16	23	30		92	16	108	26		
10	33.0	68.0	107		10	38	29		92	18	110	37		
11	39.0	66.0	101		23	22	36		86	19	105	17		
12	36.0	68.0	102		13	24	18		87	21	108	35		
13	36.0	67.0	103		5	34	35		88	19	107	34		
14	36.0	64.0	101		13	30	25		87	18	105	25		
15	34.0	68.0	102		13	23	24		87	17	104	22		
16	35.0	68.0	103		15	44	40		88	17	105	42		
17	37.0	69.0	103		19	31	28		85	19	104	30		
18	35.0	67.0	99		15	18	17		85	19	104	17		
19	36.0	70.0	101		17	36	35		90	17	107	32		
20	39.0	74.0	102		18	16	17		87	18	105	17		
平均	35.2	67.7	101.7		15.3	28.2	27.7		87.5	18.2	105.6	29.1		

葉色	/		/		/	
----	---	--	---	--	---	--

坪刈株数	50
------	----

0

月/日	項目	/	/	/	/
いもち病	数				
	程度				
紋枯病	数				
	程度				
	数				
	程度				
	数				
	程度				

月/日	項目	/	/	/	/
ヒメトビウンカ	匹				
セジロウンカ	匹				
トビイロウンカ	匹				
ツマグロヨコバイ	匹				
カメムシ類	匹				
	匹				
	匹				
	匹				

※病害数は25株中の発病株数を記入。病害程度は株全体から甚（100～76）・多（75～51）・中（50～26）・少（25～1）・無（0%）で判断。

※害虫は、すくい取り10回振り（ウンカ類）・20回振り（カメムシ類）の成虫・幼虫数計を記入。

備考：※ 雑草、水管理、土質、還元状態や肥料・農薬等耕種概要など特記事項を記入

※程長と全長は8月27日に再調査実施。

2025年度 水稻生育・収量調査野帳

設置場所	山南町梶子茂田字中車	面積	13.6	前作
担当農家		品種	夢たんば	区設定
耕種概要	播種 / 代かき / 田植え 5月4日			

項目	草丈 (cm)				分げつ (本)				収穫期調査日: 8/25 (実坪刈実施日: 8/25) 条間: 30cm 株間: 20cm					
	①	②	③	④	①	②	③	④	稈長	穂長	全長	穂数	生葉数	平均穂数 代表株
月日	6/16	6/30	7/28	/	6/16	6/30	7/28	/						
1	28.0	75.0	110		3	12	12		88	23	111	12		
2	27.0	69.0	109		4	29	27		90	20	110	27		
3	27.0	73.0	112		5	16	14		91	19	110	15		
4	30.0	71.0	115		10	29	25		93	19	112	27		
5	30.0	77.0	110		8	12	11		93	20	113	11		
6	28.0	70.0	109		8	26	26		93	20	113	27		
7	29.0	67.0	111		8	25	23		89	21	110	23		
8	28.0	69.0	110		8	28	23		89	21	110	23		
9	30.0	72.0	107		3	30	27		90	20	110	28		
10	29.0	72.0	110		10	25	22		87	24	111	23		
11	30.0	70.0	110		11	19	18		88	23	111	24		
12	29.0	68.0	104		5	28	22		92	21	113	9		
13	26.0	70.0	107		4	11	8		85	25	110	21		
14	29.0	69.0	109		8	21	27		90	21	111	22		
15	31.0	71.0	105		7	22	21		85	22	107	23		
16	29.0	70.0	107		6	24	22		88	22	110	20		
17	29.0	70.0	104		5	22	19		88	22	110	25		
18	31.0	71.0	107		6	30	31		85	20	105	15		
19	31.0	73.0	108		6	17	17		82	25	107	24		
20	29.0	71.0	107		5	25	25		87	22	109	7		
平均	29.0	70.9	108.6		6.5	22.6	21.0		88.7	21.5	110.2	20.3		

葉色	/	/	/	/
----	---	---	---	---

坪刈株数	59
------	----

2

月/日	項目	/	/	/	/
いもち病	数				
	程度				
紋枯病	数				
	程度				
	数				
	程度				
	数				
	程度				

月/日	項目	/	/	/	/
ヒメトビウンカ	匹				
セジロウンカ	匹				
トビイロウンカ	匹				
ツマグロヨコバイ	匹				
カメムシ類	匹				
	匹				
	匹				

※病害数は25株中の発病株数を記入。病害程度は株全体から甚(100~76)・多(75~51)・中(50~26)・少(25~1)・無(0%)で判断。

※害虫は、すくい取り10回振り(ウンカ類)・20回振り(カメムシ類)の成虫・幼虫数計を記入。

備考: ※ 雑草、水管理、土質、還元状態や肥料・農薬等耕種概要など特記事項を記入

※稈長と全長は8月27日に再調査実施。

2025年度 水稻生育・収量調査野帳

設置場所	山南町奥野々ヤマハナ	面積	12.3	前作
担当農家		品種	一般コシヒカリ	区設定
耕種概要	播 種 / 代かき / 田植え 5月18日			

項目	草丈 (cm)				分けつ (本)				収穫期調査日: 8/25 (実坪刈実施日: 8/25) 条間: 30cm 株間: 20cm					
	①	②	③	④	①	②	③	④	稈長	穂長	全長	穂数	生葉数	平均穂数 代表株
月日	6/16	6/30	7/28	/	6/16	6/30	7/28	/						
1	49.0	60.0	95		23	7	10		88	22	110	8		
2	43.0	60.0	97		15	19	17		89	30	119	16		
3	47.0	61.0	92		27	13	18		79	31	110	16		
4	51.0	60.0	96		22	12	12		86	19	105	12		
5	48.0	57.0	92		23	17	13		84	21	105	13		
6	50.0	58.0	92		18	24	18		88	19	107	19		
7	49.0	56.0	91		20	20	20		88	20	108	20		
8	46.0	51.0	89		7	13	12		89	13	102	12		
9	46.0	56.0	107		24	11	18		80	22	102	18		
10	49.0	62.0	98		14	19	21		85	20	105	12		
11	46.0	61.0	99		23	21	18		89	20	109	21		
12	47.0	60.0	95		27	9	8		82	23	105	15		
13	45.0	60.0	89		22	23	22		87	17	104	8		
14	46.0	61.0	96		16	19	19		88	15	103	19		
15	50.0	58.0	96		4	17	16		88	20	108	13		
16	51.0	59.0	101		9	20	15		88	20	108	14		
17	44.0	62.0	104		23	27	26		80	23	103	26		
18	42.0	59.0	99		14	13	12		90	18	108	12		
19	46.0	57.0	96		22	12	9		83	21	104	11		
20	46.0	57.0	99		9	11	12		85	20	105	11		
平均	47.1	58.8	96.2		18.1	16.4	15.8		85.8	20.7	106.5	14.8		

葉色	/		/		/	
----	---	--	---	--	---	--

坪刈株数	62
------	----

0

月/日	項目	/	/	/	/
いもち病	数				
	程度				
紋枯病	数				
	程度				
	数				
	程度				
	数				
	程度				

月/日	項目	/	/	/	/
	ヒメトビウンカ	匹			
	セジロウンカ	匹			
	トビイロウンカ	匹			
	ツマグロヨコバイ	匹			
	カメムシ類	匹			
		匹			
		匹			
		匹			

※病害数は25株中の発病株数を記入。病害程度は株全体から甚（100～76）・多（75～51）・中（50～26）・少（25～1）・無（0%）で判断。

※害虫は、すくい取り10回振り（ウンカ類）・20回振り（カメムシ類）の成虫・幼虫数計を記入。

備考：※ 雑草、水管理、土質、還元状態や肥料・農薬等耕種概要など特記事項を記入

※稈長と全長は8月27日に再調査実施。

2025年度 水稻生育・収量調査野帳

設置場所	水上町南油良オオギリ	面積	28.8	前作
担当農家		品種	夢たんば	区 設定
耕種概要	播 種 / 代かき / 田植え 5月3日			

項目	草丈 (cm)				分けつ (本)				収穫期調査日 : 8/25 (実坪刈実施日 : 8/25) 条間 : 35cm 株間 : 20cm					
	①	②	③	④	①	②	③	④	稈長	穂長	全長	穂数	生葉数	平均穂数 代表株
月日	6/16	6/30	7/28	/	6/16	6/30	7/28	/						
1	36.0	70.0	101.0		9	11	11		89	13	102	16		
2	45.0	71.0	99.0		8	11	10		86	18	104	10		
3	41.0	70.0	101.0		13	20	15		81	18	99	15		
4	39.0	74.0	99.0		11	18	15		87	18	105	13		
5	44.0	74.5	100.0		7	18	12		83	18	101	11		
6	40.0	67.0	97.0		16	20	12		80	19	99	15		
7	40.0	70.0	102.0		21	26	13		82	18	100	18		
8	38.0	70.0	96.0		15	17	14		80	18	98	15		
9	38.0	75.5	98.0		11	20	14		78	18	96	16		
10	39.0	67.0	96.0		11	19	14		80	18	98	14		
11	36.0	70.5	100.0		14	19	8		81	19	100	18		
12	44.0	76.5	104.0		7	12	9		84	18	102	17		
13	39.0	75.5	100.0		11	22	19		78	22	100	9		
14	41.0	74.0	101.0		17	31	27		80	19	99	20		
15	39.0	73.5	101.0		14	21	16		86	16	102	27		
16	40.0	76.0	103.0		14	21	20		80	17	97	18		
17	44.0	75.5	100.0		13	18	17		82	19	101	17		
18	40.0	73.0	104.0		17	18	12		85	18	103	17		
19	40.0	73.0	103.0		16	23	17		84	17	101	21		
20	36.0	73.0	101.0		20	22	17		85	19	104	17		
平均	40.0	72.5	100.3		13.3	19.4	14.6		82.6	18.0	100.6	16.2		

葉色 / / / /

坪刈株数 60

0

月/日	項目	/	/	/	/
いもち病	数				
	程度				
紋 枯 病	数				
	程度				
	数				
	程度				
	数				
	程度				

月/日	項目	/	/	/	/
ヒメトビウンカ	匹				
セジロウンカ	匹				
トビイロウンカ	匹				
ツマグロヨコバイ	匹				
カメムシ類	匹				
	匹				
	匹				
	匹				

※病害数は25株中の発病株数を記入。病害程度は株全体から甚（100～76）・多（75～51）・中（50～26）・少（25～1）・無（0%）で判断。

※害虫は、すくい取り10回振り（ウンカ類）・20回振り（カメムシ類）の成虫・幼虫数計を記入。

備考：※ 雑草、水管理、土質、還元状態や肥料・農薬等耕種概要など特記事項を記入

2025年度 水稻生育・収量調査野帳

設置場所	水上町小野ヒノマ	面積	29	前作
担当農家		品種	一般コシヒカリ	
耕種概要	播 種 / 代かき / 田植え	区 設定	5月2日	

項目	草丈 (cm)				分けつ (本)				収穫期調査日: 8/25 (実坪刈実施日: 8/25) 条間: 30cm 20					
	①	②	③	④	①	②	③	④	稈長	穂長	全長	穂数	生葉数	平均穂数 代表株
月日	6/16	6/30	7/28	/	6/16	6/30	7/28	/						
1	50.0	74.0	117.0		13	17	11		90	16	106	11		
2	49.0	74.0	114.0		25	28	22		88	17	105	22		
3	48.0	74.0	112.0		19	19	16		84	20	104	16		
4	46.0	74.0	112.0		20	28	21		85	20	105	23		
5	52.0	78.0	119.0		19	28	22		89	19	108	22		
6	49.0	78.0	117.0		21	26	19		92	16	108	19		
7	50.0	74.0	113.0		28	22	21		92	19	111	21		
8	52.0	79.0	113.0		25	26	27		91	20	111	26		
9	39.0	69.0	103.0		9	12	8		88	20	108	8		
10	53.0	75.0	112.0		19	31	27		94	16	110	27		
11	50.0	74.0	114.0		11	24	17		86	19	105	15		
12	50.0	75.0	117.0		9	15	10		85	20	105	12		
13	48.0	72.0	112.0		23	33	22		92	18	110	25		
14	46.0	71.0	111.0		24	27	19		84	18	102	23		
15	47.0	73.0	106.0		18	22	16		88	18	106	18		
16	49.0	71.0	112.0		23	26	25		88	19	107	22		
17	49.0	75.0	111.0		25	26	16		85	17	102	22		
18	51.0	74.0	107.0		28	26	21		84	19	103	23		
19	49.0	74.0	113.0		14	13	12		86	23	109	12		
20	50.0	76.0	111.0		24	27	20		88	18	106	23		
平均	48.9	74.2	112.3		19.9	23.8	18.6		88.0	18.6	106.6	19.5		

葉色	/	/	/	/
----	---	---	---	---

坪刈株数	52
------	----

1

月/日	項目	/	/	/	/
いもち病	数				
	程度				
紋枯病	数				
	程度				
	数				
	程度				
	数				
	程度				

月/日	項目	/	/	/	/
ヒメトビウンカ	匹				
セジロウンカ	匹				
トビイロウンカ	匹				
ツマグロヨコバイ	匹				
カメムシ類	匹				
	匹				
	匹				

※病害数は25株中の発病株数を記入。病害程度は株全体から甚(100~76)・多(75~51)・中(50~26)・少(25~1)・無(0%)で判断。

※害虫は、すくい取り10回振り(ウンカ類)・20回振り(カメムシ類)の成虫・幼虫数計を記入。

備考: ※ 雑草、水管理、土質、還元状態や肥料・農薬等耕種概要など特記事項を記入

※稈長と全長は8月27日に再調査実施。

2025年度 水稻生育・収量調査野帳

設置場所	青垣町（小稗）文室ナカシマ	面積	37.2	前作
担当農家	品種		夢たんば	区 設定
耕種概要	播 種	/	代かき	
			田植え	5月5日

項目	草丈 (cm)				分けつ (本)				収穫期調査日： 8/25 (実坪刈実施日： 8/25) 条間： 30cm 株間： 20cm					
	①	②	③	④	①	②	③	④	稈長	穂長	全長	穂数	生葉数	平均穂数 代表株
月日	6/16	6/30	7/28	/	6/16	6/30	7/28	/						
1	34.0	61.5	96.0		13	26	26		79	13	92	24		
2	36.0	60.0	94.0		10	19	18		79	16	95	15		
3	33.0	58.0	88.0		11	17	17		78	16	94	15		
4	37.0	61.5	94.0		19	26	27		81	11	92	25		
5	30.0	57.5	88.0		14	23	20		76	12	88	20		
6	34.0	61.5	93.0		13	25	21		78	14	92	21		
7	33.0	60.0	87.0		16	24	16		80	10	90	18		
8	34.0	62.0	95.0		22	32	25		79	13	92	25		
9	37.0	65.5	96.0		22	19	29		78	19	97	18		
10	38.0	65.5	92.0		12	19	19		70	19	89	23		
11	31.0	62.0	93.0		22	25	24		77	14	91	20		
12	36.0	62.0	88.0		12	24	12		79	15	94	27		
13	34.0	66.0	98.0		20	27	26		80	15	95	17		
14	40.0	65.5	98.0		10	24	17		75	16	91	16		
15	36.0	61.0	87.0		9	32	14		77	13	90	31		
16	37.0	64.5	97.0		18	20	25		78	12	90	31		
17	39.0	61.0	99.0		9	21	18		80	14	94	19		
18	41.0	67.0	95.0		6	20	20		83	16	99	17		
19	39.0	68.0	95.0		7	14	18		80	16	96	19		
20	37.0	59.5	97.0		9	10	24		92	7	99	23		
平均	35.8	62.5	93.5		13.7	22.4	20.8		79.0	14.0	93.0	21.2		

葉色	/		/		/	
----	---	--	---	--	---	--

坪刈株数	47
------	----

0

月/日	項目	/	/	/	/
いもち病	数				
	程度				
紋枯病	数				
	程度				
	数				
	程度				
	数				
	程度				

月/日	項目	/	/	/	/
ヒメトビウンカ	匹				
セジロウンカ	匹				
トビイロウンカ	匹				
ツマグロヨコバイ	匹				
カメムシ類	匹				
	匹				
	匹				

※病害数は25株中の発病株数を記入。病害程度は株全体から甚（100～76）・多（75～51）・中（50～26）・少（25～1）・無（0%）で判断。

※害虫は、すくい取り10回振り（ウンカ類）・20回振り（カメムシ類）の成虫・幼虫数計を記入。

備考：※ 雑草、水管理、土質、還元状態や肥料・農薬等耕種概要など特記事項を記入

2025年度 水稻生育・収量調査野帳

設置場所	青垣町東芦田シモシマジ	面積	18.9	前作
担当農家		品種	一般コシヒカリ	区設定
耕種概要	播 種 / 代かき / 田植え 5月10日			

項目	草丈 (cm)				分けつ (本)				収穫期調査日: 8/25 (実坪刈実施日: 8/25) 条間: 28cm 株間: 20cm					
	①	②	③	④	①	②	③	④	稈長	穂長	全長	穂数	生葉数	平均穂数 代表株
月日	6/16	6/30	7/28	/	6/16	6/30	7/28	/						
1	29.0	74.0	99.0		8	19	18		89	17	106	16		
2	31.0	70.0	96.0		21	34	26		90	13	103	16		
3	33.0	72.0	103.0		14	24	22		87	20	107	11		
4	33.0	76.0	110.0		21	28	30		90	14	104	24		
5	30.0	71.0	103.0		26	25	25		85	16	101	15		
6	32.0	68.0	103.0		17	23	22		83	18	101	18		
7	34.0	73.0	98.0		18	23	19		90	15	105	19		
8	33.0	68.0	103.0		22	30	21		85	16	101	26		
9	35.0	72.0	104.0		13	27	21		84	13	97	18		
10	33.0	72.0	103.0		23	30	19		85	15	100	21		
11	34.0	70.0	97.0		17	30	25		83	17	100	27		
12	34.0	70.0	96.0		15	17	15		87	11	98	20		
13	33.0	72.0	100.0		16	15	17		86	13	99	22		
14	33.0	69.0	104.0		22	21	19		83	15	98	20		
15	34.0	69.0	101.0		22	15	16		87	15	102	20		
16	31.0	70.0	94.0		12	22	19		82	16	98	20		
17	27.0	72.0	92.0		6	10	10		81	14	95	12		
18	27.0	70.0	91.0		12	17	16		80	17	97	18		
19	28.0	66.0	99.0		27	19	23		81	13	94	23		
20	34.0	71.0	99.0		19	19	20		83	15	98	20		
平均	31.9	70.8	99.8		17.6	22.4	20.2		85.1	15.2	100.2	19.3		

葉色	/	/	/	/
----	---	---	---	---

坪刈株数	59
------	----

0

月/日	項目	/	/	/	/
いもち病	数				
	程度				
紋枯病	数				
	程度				
	数				
	程度				
	数				
	程度				

月/日	項目	/	/	/	/
ヒメトビウンカ	匹				
セジロウンカ	匹				
トビイロウンカ	匹				
ツマグロヨコバイ	匹				
カメムシ類	匹				
	匹				
	匹				

※病害数は25株中の発病株数を記入。病害程度は株全体から甚(100~76)・多(75~51)・中(50~26)・少(25~1)・無(0%)で判断。

※害虫は、すくい取り10回振り(ウンカ類)・20回振り(カメムシ類)の成虫・幼虫数計を記入。

備考: ※ 雑草、水管理、土質、還元状態や肥料・農薬等耕種概要など特記事項を記入

2025年度 水稻生育・収量調査野帳

設置場所	市島町上竹田シュク	面積	10.7	前作
担当農家		品種	一般コシヒカリ	区設定
耕種概要	播種 / 代かき / 田植え 5月5日			

項目	草丈 (cm)				分げつ (本)				収穫期調査日: 8/25 (実坪刈実施日: 8/25) 条間: 31cm 株間: 25cm					
	①	②	③	④	①	②	③	④	稈長	穂長	全長	穂数	生葉数	平均穂数 代表株
月日	6/16	6/30	7/28	/	6/16	6/30	7/28	/						
1	37.0	80.0	101.0		10	30	30		77	22	99	16		
2	38.0	85.0	104.0		6	19	22		78	△ 66	12	20		
3	37.0	88.0	104.0		11	30	29		71	25	96	27		
4	37.0	82.0	106.0		10	29	33		80	22	102	27		
5	36.0	83.0	100.0		6	32	23		81	21	102	23		
6	33.0	88.0	99.0		6	21	25		82	18	100	22		
7	35.0	84.0	100.0		15	32	32		78	21	99	31		
8	38.0	83.0	99.0		12	27	23		76	22	98	23		
9	36.0	86.0	100.0		19	20	28		77	22	99	28		
10	37.0	85.0	99.0		11	26	19		82	16	98	21		
11	36.0	80.0	102.0		14	25	24		78	22	100	26		
12	37.0	82.0	100.0		7	24	19		78	19	97	19		
13	38.0	78.0	98.0		12	31	23		83	17	100	22		
14	40.0	78.0	99.0		18	33	24		76	23	99	29		
15	35.0	75.0	103.0		17	25	25		78	21	99	29		
16	37.0	73.0	103.0		15	12	26		79	22	101	26		
17	35.0	80.0	107.0		10	38	25		81	23	104	24		
18	38.0	78.0	106.0		14	35	26		80	22	102	29		
19	37.0	77.0	106.0		9	22	20		80	20	100	20		
20	37.0	78.0	104.0		15	27	25		90	17	107	26		
平均	36.7	81.2	102.0		11.9	26.9	25.1		79.3	16.5	95.7	24.4		

葉色	/	/	/	/
----	---	---	---	---

坪刈株数	47
------	----

5

月/日	項目	/	/	/	/
いもち病	数				
	程度				
紋枯病	数				
	程度				
	数				
	程度				
	数				
	程度				

月/日	項目	/	/	/	/
ヒメトビウンカ	匹				
セジロウンカ	匹				
トビイロウンカ	匹				
ツマグロヨコバイ	匹				
カメムシ類	匹				
	匹				
	匹				

※病害数は25株中の発病株数を記入。病害程度は株全体から甚(100~76)・多(75~51)・中(50~26)・少(25~1)・無(0%)で判断。

※害虫は、すくい取り10回振り(ウンカ類)・20回振り(カメムシ類)の成虫・幼虫数計を記入。

備考: ※ 雑草、水管理、土質、還元状態や肥料・農薬等耕種概要など特記事項を記入

2025年度 水稻生育・収量調査野帳

設置場所	市島町上竹田下左折			面積	28.1	前作	夢たんば
担当農家				品種	夢たんば		
耕種概要	播 種	/	代かき	/	田植え	5/2	
				区 設定			

項目	草丈 (cm)				分けつ (本)				収穫期調査日： 8/14 (実坪刈実施日： 8/14) 条間： 32cm 株間： 28cm					
	①	②	③	④	①	②	③	④	稈長	穂長	全長	穂数	生葉数	平均穂数 代表株
月日	6/16	6/30	7/28	/	6/16	6/30	7/28	/						
1	48.0	62.0	115.0		25	25	28		97	18	115	23		○
2	53.0	65.0	115.0		12	21	16		95	20	115	16		
3	50.0	61.0	111.0		27	27	35		94	18	112	31		
4	50.0	64.0	112.0		24	20	27		94	17	111	25		
5	51.0	61.0	118.0		24	17	32		98	20	118	31		
6	50.0	62.0	115.0		13	17	18		97	20	117	16		
7	51.0	62.0	117.0		27	32	31		101	17	118	28		
8	51.0	68.0	116.0		18	19	22		98	17	115	24		
9	55.0	65.0	113.0		10	24	18		98	20	118	21		
10	53.0	64.0	119.0		22	24	23		99	21	120	25		
11	47.0	65.0	110.0		16	23	22		93	19	112	21		
12	51.0	58.0	110.0		14	17	20		91	19	110	19		
13	50.0	62.0	112.0		26	21	25		93	19	112	25		
14	48.0	66.0	114.0		18	33	30		97	17	114	29		
15	47.0	66.0	114.0		19	30	21		97	18	115	23		○
16	46.0	64.0	109.0		11	26	12		91	17	108	9		
17	56.0	66.0	113.0		29	23	30		92	18	110	32		
18	48.0	65.0	112.0		27	28	29		96	17	113	30		
19	51.0	65.0	112.0		22	19	20		94	18	112	18		
20	49.0	66.0	112.0		23	23	20		95	18	113	19		
平均	50.3	63.9	113.5		20.4	23.5	24.0		95.5	18.4	113.9	23.3		

葉色	/		/		/	
----	---	--	---	--	---	--

坪刈株数	39
------	----

2

月/日	項目	/	/	/	/
いもち病	数				
	程度				
紋 枯 病	数				
	程度				
	数				
	程度				
	数				
	程度				

月/日	項目	/	/	/	/
ヒメトビウンカ	匹				
セジロウンカ	匹				
トビイロウンカ	匹				
ツマグロヨコバイ	匹				
カメムシ類	匹				
	匹				
	匹				

※病害数は25株中の発病株数を記入。病害程度は株全体から甚（100～76）・多（75～51）・中（50～26）・少（25～1）・無（0%）で判断。

※害虫は、すくい取り10回振り（ウンカ類）・20回振り（カメムシ類）の成虫・幼虫数計を記入。

備考：※ 雑草、水管理、土質、還元状態や肥料・農薬等耕種概要など特記事項を記入

2025年度 水稻生育・収量調査野帳

設置場所	春日町多利		面積	19.9	前作
担当農家			品種	一般コシヒカリ	
耕種概要	播種	/	代かき	/	田植え 5月4日
			区設定		

項目	草丈 (cm)				分けつ (本)				収穫期調査日: 8/25 (実坪刈実施日: 8/25) 条間: 30cm 株間: 25cm					
	①	②	③	④	①	②	③	④	稈長	穂長	全長	穂数	生葉数	平均穂数 代表株
月日	6/16	6/30	7/28	/	6/16	6/30	7/28	/						
1	43.0	67.0	105.0		12	26	25		82	20	102	25		
2	41.0	66.0	101.0		9	18	14		79	21	100	16		
3	40.0	67.0	108.0		15	26	23		80	22	102	23		
4	39.0	65.0	103.0		13	28	24		80	19	99	26		
5	41.0	66.0	108.0		7	14	13		82	19	101	14		
6	40.0	69.0	108.0		16	29	21		80	21	101	30		
7	38.0	71.0	101.0		15	32	35		83	17	100	31		
8	43.0	72.0	106.0		7	19	18		82	20	102	19		
9	35.0	64.0	102.0		9	18	20		82	19	101	19		
10	37.0	65.0	102.0		9	21	20		78	17	95	20		
11	41.0	72.0	103.0		18	29	25		81	20	101	29		
12	39.0	65.0	98.0		8	19	25		80	19	99	20		
13	41.0	72.0	104.0		25	26	22		80	18	98	27		
14	38.0	69.0	104.0		26	25	25		77	19	96	29		
15	35.0	69.0	101.0		18	23	25		81	20	101	27		
16	38.0	69.0	104.0		15	20	21		78	21	99	21		
17	37.0	70.0	102.0		15	28	26		79	20	99	25		
18	44.0	72.0	103.0		20	31	28		84	18	102	31		
19	38.0	70.0	104.0		10	22	22		85	20	105	22		
20	45.0	72.0	107.0		8	17	18		78	24	102	18		
平均	39.7	68.6	103.7		13.8	23.6	22.5		80.6	19.7	100.3	23.6		

葉色	/		/		/	
----	---	--	---	--	---	--

坪刈株数	46	3=
------	----	----

月/日	項目	/	/	/	/
いもち病	数				
	程度				
紋枯病	数				
	程度				
	数				
	程度				
	数				
	程度				

月/日	項目	/	/	/	/
ヒメトビウンカ	匹				
セジロウンカ	匹				
トビイロウンカ	匹				
ツマグロヨコバイ	匹				
カメムシ類	匹				
	匹				
	匹				

※病害数は25株中の発病株数を記入。病害程度は株全体から甚(100~76)・多(75~51)・中(50~26)・少(25~1)・無(0%)で判断。

※害虫は、すくい取り10回振り(ウンカ類)・20回振り(カメムシ類)の成虫・幼虫数計を記入。

備考: ※ 雑草、水管理、土質、還元状態や肥料・農薬等耕種概要など特記事項を記入

--

2025年度 水稻生育・収量調査野帳

設置場所	春日町稲塚	面積	19.4	前作	コシ(夢たんば)
担当農家		品種	夢たんば	区設定	
耕種概要	播種	/	代かき	/	田植え 5月4日

項目	草丈 (cm)				分けつ (本)				収穫期調査日: 8/14 (実坪刈実施日: 8/18) 条間: 31cm 株間: 17cm					
	①	②	③	④	①	②	③	④	稈長	穂長	全長	穂数	生葉数	平均穂数 代表株
月日	6/16	6/30	7/28	/	6/16	6/30	7/28	/						
1	50.0	82.0	112.0		27	44	43		93	16	109	38		
2	52.0	80.0	110.0		26	34	30		95	13	108	29		
3	53.0	81.0	106.0		22	38	35		88	16	104	32		○
4	50.0	88.0	108.0		31	40	41		90	17	107	32		
5	53.0	84.0	109.0		36	42	45		91	18	109	38		
6	50.0	78.0	107.0		22	32	31		87	16	103	26		
7	53.0	82.0	114.0		30	34	29		96	19	115	25		
8	50.0	85.0	111.0		25	40	36		90	17	107	32		
9	56.0	94.0	110.0		28	34	31		91	16	107	32		○
10	57.0	85.0	111.0		30	38	35		90	18	108	38		
11	57.0	84.0	112.0		26	26	21		91	17	108	22		
12	54.0	83.0	111.0		35	35	30		92	18	110	33		
13	59.0	84.0	113.0		28	32	21		94	17	111	26		
14	53.0	87.0	111.0		43	41	34		95	△ 84	11	38		
15	56.0	87.0	112.0		37	36	26		96	17	113	28		
16	55.0	86.0	111.0		33	33	29		90	17	107	29		
17	54.0	87.0	114.0		33	42	34		94	17	111	39		
18	52.0	85.0	112.0		28	27	23		95	16	111	24		
19	53.0	80.0	115.0		36	38	29		91	18	109	30		
20	53.0	82.0	117.0		38	43	33		94	17	111	37		
平均	53.5	84.2	111.3		30.7	36.5	31.8		92.2	11.8	104.0	31.4		

葉色	/	/	/	/
----	---	---	---	---

坪刈株数 38

2

月/日	項目	/	/	/	/
いもち病	数				
	程度				
紋枯病	数				
	程度				
	数				
	程度				
	数				
	程度				

月/日	項目	/	/	/	/
ヒメトビウンカ	匹				
セジロウンカ	匹				
トビイロウンカ	匹				
ツマグロヨコバイ	匹				
カメムシ類	匹				
	匹				
	匹				
	匹				

※病害数は25株中の発病株数を記入。病害程度は株全体から甚(100~76)・多(75~51)・中(50~26)・少(25~1)・無(0%)で判断。

※害虫は、すくい取り10回振り(ウンカ類)・20回振り(カメムシ類)の成虫・幼虫数計を記入。

備考: ※ 雑草、水管理、土質、還元状態や肥料・農薬等耕種概要など特記事項を記入