

班	地域	25株発生株数調査								本田 10回(5回往復)振りすくい取り調査												20回振 カメムシ	10株払い落とし調査										
		発生株数								頭数													頭数										
		いもち病	穂いもち病	紋枯病	ニカメイチュウ	イネミズウムシ	イネツトムシ	コブノメイガ	フタオビコヤガ	ヒメトビウンカ		セジロウンカ		トビイロウンカ		ツマグロヨコバイ		フタオビコヤガ		ヒメトビウンカ			セジロウンカ		トビイロウンカ		ツマグロヨコバイ		フタオビコヤガ		カメムシ		
1	下司							1		幼	成	幼	成	幼	成	幼	成	幼	成	1	幼	成	幼	成	幼	成	幼	成	幼	成			
	北山							1																					1				
	尾崎園出							1			1		1																				
	生田									7	2	4	4			1	11				1			2	3			1	2				
2	宮前											1								1	5				5								
	小田									2	1										1	3		1	1								
	中持						3			20	5	5	1			3	4							15	1								
	橋本					1				3	3	2			3				1		13	1						5	3				
3	木曽上							1		7	24	214	249							1	4			47	38								
	広石中											5	4																				
	都志											1	7								1												
	下塚			2																	5	2		2									
4	新村						5	17		2	1	2				2	3			22		1	5	5					2				
	由良							12			60	250											12	66									
	下内善									11	34	12	21										15	3	2	2							
	中川原							2				6				2	1						11	4	23								
平均株数		0.0		0.1	0.0	0.1	0.5	2.2	0.0	3.3	8.3	15.8	33.6	0.0	0.0	0.7	1.2	0.0	0.0	1.6	3.4	0.9	7.1	7.3	0.0	0.0	0.4	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	
発生地点率		0.0		6.3	0.0	6.3	12.5	43.8	0.0	43.8	62.5	62.5	56.3	0.0	0.0	31.3	25.0	0.0	0.0	25.0	50.0	37.5	62.5	43.8	0.0	0.0	12.5	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
和7年同時期調査結		0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	1.3	4.9	0.0	6.2	12.6	20.6	39.2	0.0	0.0	2.7	2.8			3.2	6.8	3.3	11.5	10.4	0.0	0.0	1.2	2.0					
和6年同時期調査結		12.5	0.0	18.8	12.5	18.8	25.0	43.8	12.5	56.3	68.8	75.0	68.8	12.5	12.5	43.8	37.5			37.5	62.5	50.0	75.0	56.3	12.5	12.5	25.0	31.3					
和5年同時期調査結		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	1.5	6.9	12.9	0.0	0.0	0.8	6.0	0.0	0.0	1.1	3.1	5.2	13.3	8.4	0.0	0.0	1.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	
和4年同時期調査結		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.5	50.0	81.3	75.0	0.0	0.0	25.0	37.5	0.0	0.0	43.8	50.0	31.3	56.3	56.3	0.0	0.0	18.8	18.8	0.0	0.0	0.0	0.0	
和3年同時期調査結		2.1		1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.7	0.4	12.4	4.0	0.0	0.0	1.6	2.1	0.0	0.0	1.0	0.3	0.4	4.6	1.0	0.0	0.0	0.9	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	
和2年同時期調査結		25.0		31.3	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	18.8	25.0	37.5	50.0	0.0	0.0	25.0	37.5	0.0	0.0	37.5	25.0	25.0	31.3	43.8	0.0	0.0	31.3	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
和1年同時期調査結		3.0		1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	1.5	18.5	7.3	0.0	0.0	3.2	5.7	0.0	0.0	1.1	2.9	0.5	3.1	1.6	0.0	0.0	0.8	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	
和0年同時期調査結		37.5		43.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.8	25.0	81.3	81.3	0.0	0.0	18.8	31.3	0.0	0.0	62.5	56.3	25.0	56.3	50.0	0.0	0.0	37.5	6.3	0.0	0.0	6.3	6.3	
和-1年同時期調査結		2.2		1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.1	3.8	0.3	0.0	0.0	1.9	0.6	0.0	0.0	0.2	1.4	0.3	7.6	3.1	0.0	0.0	0.7	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	
和-2年同時期調査結		25.0		18.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	12.5	31.3	18.8	0.0	0.0	43.8	25.0	0.0	0.0	18.8	37.5	12.5	62.5	31.3	0.0	0.0	25.0	37.5	0.0	0.0	0.0	0.0	

◎結果と考察

- 1 ヒメトビウンカ、セジロウンカは全体的に発生しているが、木曽上と由良ではセジロウンカが著しく増加しているため今後注意が必要である。
- 2 カメムシ類は散見されるが、特に由良は注意する必要がある。

◎対 策

- 1 台風の発生が多いので、トビイロウンカの飛来が懸念されるので今後注意が必要である。
- 2 畦畔の草刈り、周囲の休耕田があるところは注意喚起を怠らない。