

調査結果速報

豊岡市コウホリ共生部 農業共済課
豊岡農業改良普及センター
たじま農業協同組合

◆ 調査結果(竹野地域) 《 紋枯れ病・葉いもち病 》

No.	地区	調査ほ場	品種	田植え	紋枯れ病 発生程度	葉いもち病 発生程度
12	中村	アソウダ 1759	コシカ	5/8	無	少
13	小城	クマナカ 317	コシカ	5/10	少	少
14	三原	カミチラダイ 1008、1009	コシカ	5/8	無	無
15	大森	イコウ 264、264-1	コシカ	5/13	無	少
16	須谷	ムコウダイ 306	コシカ	5/17	無	無
17	竹野	ヒロタ 1532	コシカ	5/20	無	少
18	須井	ナカダ 525-1	コシカ	5/16	無	無

(※25株調査)

《 ウンカ類・カメムシ 》

No.	地区	セジロウンカ 発生程度	トビイロウンカ 発生程度	カメムシ 捕虫数(頭)	備考
12	中村	少	無	1	
13	小城	無	無	0	
14	三原	無	無	0	
15	大森	少	無	1	
16	須谷	少	無	0	
17	竹野	無	無	0	
18	須井	少	無	0	

(※10回網振り)

◆ 生育状況

				平成21年				平成20年			
				6月17日調査		7月14日調査		6月17日調査		7月9日調査	
No.	地区	品種	田植え	草丈	茎数	草丈	茎数	草丈	茎数	草丈	茎数
13	小城	コシカ	5/10	33.2 cm	15.5 本	66.6 cm	15.7 本	33.4 cm	11.1 本	60.1 cm	14.3 本
16	須谷	コシカ	5/17	25.3 cm	12.5 本	73.7 cm	24.5 本	29.5 cm	16.8 本	67.1 cm	26.2 本

(※10株平均値)

◆ 病虫害発生状況と今後の管理について

☆ いもち病

いもち病は、少発生ながら多くの調査ほ場で、発生が見られました。

いもち病は25～28℃前後で湿度が高いと発生しやすくなります。今後の天候により、葉いもち・穂いもち病の多発も心配されるので、出穂前の防除をしましょう。

☆ 紋枯病

紋枯病の発生は、一部ほ場で確認されました。

紋枯病は高温年で発生が多くなります。昨年発生したほ場では特に注意が必要で、あぜぎわからよく発生します。稲の茎に病斑が発生していないかよく観察しましょう。

☆ ウンカ類・カメムシ類

ウンカ、カメムシの発生は、現在のところ少ない状況です。

カメムシは、特にイネ科雑草の穂が大好きです。田んぼの中のヒエなどは早期に抜き取りましょう。出穂2週間前までに、あぜやほ場周辺の耕作放棄地の草刈りを行いましょう。それ以降は、雑草が穂をつけないようにこまめに草刈りを行いましょう。

☆ 水管理

出穂前後2週間は、稲にとって最も水を必要とする時期ですので、水を切らないように管理してください。

☆ 農薬を散布する場合、隣接する野菜ほ場などに飛散しないように注意しましょう。