

調査結果速報

豊岡市コウトリ共生部 農業共済課
豊岡農業改良普及センター
たじま農業協同組合

◆ 調査結果(但東地域) 《 紋枯れ病・葉いもち病 》

No.	地区	調査ほ場	品種	田植え	紋枯れ病 発生程度	葉いもち病 発生程度
33	畑	ミノヤ 1007	コシカリ	5/15	無	無
34	河本	センボンガキ 17-1	コシカリ	5/12	無	無
35	相田	ウメガツホ 1015	コシカリ	5/20	無	無
36	久畑	シモガワラ 933、934	コシカリ	5/10	無	無
37	三原	サルユウ 662	コシカリ	5/11	無	無
38	坂野	ナカミチ 1245	コシカリ	5/13	無	無
39	中藤	ヤマゾエ 737	マンゲツモチ	5/19	無	無
40	日場	ウメハラ 445	コシカリ	5/10	無	無

(※25株調査)

《 ウンカ類・カメムシ 》

No.	地区	セジロウンカ 発生程度	トビイロウンカ 発生程度	カメムシ 捕虫数(頭)	備考
33	畑	少	無	2	
34	河本	無	無	0	
35	相田	少	無	0	
36	久畑	少	無	0	
37	三原	少	無	0	
38	坂野	少	無	0	
39	中藤	少	無	1	
40	日場	少	無	0	

(※10回網振り)

◆ 生育状況

					平成21年						平成20年			
					6月17日調査		7月14日調査				6月17日調査		7月9日調査	
No.	地区	品種	田植え		草丈	茎数	草丈	茎数			草丈	茎数	草丈	茎数
33	畑	コシカリ	5/15		35.6 cm	11.7 本	71.4 cm	14.9 本			29.7 cm	16.9 本	62.3 cm	24.6 本
38	坂野	コシカリ	5/13		32.7 cm	16.0 本	74.1 cm	21.3 本			34.6 cm	14.1 本	67.2 cm	24.7 本

(※10株平均値)

◆ 病虫害発生状況と今後の管理について

☆ いもち病

いもち病は、今回の調査ほ場では確認されませんでした。

いもち病は25～28℃前後で湿度が高いと発生しやすくなります。今後の天候により、葉いもち・穂いもち病の発生も多発も心配されるので、ほ場をよく観察しましょう。

☆ 紋枯病

紋枯病の発生は、今回の調査ほ場では確認されませんでした。

紋枯病は高温年で発生が多くなります。昨年発生したほ場では特に注意が必要で、あぜぎわからよく発生します。稲の茎に病斑が発生していないかよく観察しましょう。

☆ ウンカ類・カメムシ類

ウンカの発生は少ない状況です。また、カメムシは、一部の調査ほ場で発生が見られました。

カメムシは、特にイネ科雑草の穂が大好きです。田んぼの中のヒエなどは早期に抜き取りましょう。出穂2週間前までに、あぜの草刈りを行いましょう。それ以降は、雑草が穂をつけないようにこまめに草刈りを行いましょう。

☆ 水管理

出穂前後2週間は、稲にとって最も水を必要とする時期ですので、水を切らないように管理してください。

☆ 農薬を散布する場合、隣接する野菜ほ場などに飛散しないように注意しましょう。