

調査結果速報

豊岡市コウトリ共生部 農業共済課
豊岡農業改良普及センター
たじま農業協同組合

◆ 調査結果(竹野地域) 《 紋枯れ病・葉いもち病 》

No.	地区	調査ほ場	品種	田植え	紋枯れ病 発生程度	葉いもち病 発生程度
12	中村	アソウダ 1759	コシヒカリ	5/7	無	無
13	小城	クマナカ 317	コシヒカリ	5/14	無	無
14	三原	カミアチラダイ 1008、1009	コシヒカリ	5/16	無	無
15	大森	イコウ 264、264-1	コシヒカリ(つちかおり)	5/14	無	無
16	須谷	ムコウダイ 306	コシヒカリ	5/16	無	無
17	竹野	ヒロタ 1532	コシヒカリ	5/21	無	無
18	浜須井	ナカタ 525-1	コシヒカリ	5/14	無	無

(※25株調査)

《 ウンカ類・カメムシ 》

No.	地区	セジロウンカ 発生程度	トビイロウンカ 発生程度	カメムシ 捕虫数(頭)	備考
12	中村	微	無	無	
13	小城	無	無	無	
14	三原	微	無	無	
15	大森	微	無	無	
16	須谷	微	無	無	
17	竹野	無	無	無	
18	須井	微	無	無	

(※10回網振り)

◆ 生育状況

No.	地区	品種	田植え	平成23年				平均値(平成19年～22年)			
				6月16日調査		7月5日調査		6月10日前後調査		7月10日前後調査	
				草丈	茎数	草丈	茎数	草丈	茎数	草丈	茎数
13	小城	コシヒカリ	5/14	30.1 cm	8.3 本	73.8 cm	15.4 本	34.8 cm	13.5 本	71.2 cm	17.0 本
16	須谷	コシヒカリ	5/16	24.9 cm	8.7 本	65.0 cm	16.5 本	28.6 cm	14.6 本	73.8 cm	24.5 本

(※10株平均値)

◆ 病害虫発生状況と今後の管理について

☆ いもち病

いもち病の発生は、確認されませんでした。いもち病は25～28℃前後で湿度が高いと発生しやすくなります。今後の天候により、葉いもち・穂いもち病の多発も心配されるので、出穂前の防除をしましょう。

☆ 紋枯病

紋枯病の発生は、確認されませんでした。紋枯病は高温年で発生が多くなります。昨年発生したほ場では特に注意が必要で、あぜぎわからよく発生します。稲の茎に病斑が発生していないかよく観察しましょう。

☆ ウンカ類・カメムシ類

ウンカ、カメムシの発生は、現在のところ少ない状況です。

カメムシは、特にイネ科雑草の穂が大好きです。田んぼの中のヒエなどは早期に抜き取りましょう。出穂2週間前までに、あぜやほ場周辺の耕作放棄地の草刈りを行いましょう。それ以降は、雑草が穂をつけないようにこまめに草刈りを行いましょう。

☆ 水管理

中干しを遅らせているほ場が見受けられましたが、茎数が確保され次第、速やかに中干しを行って下さい。

☆ 農薬を散布する場合、隣接する野菜ほ場などに飛散しないように注意しましょう。