

調査結果速報

豊岡市コウトリ共生部 農業共済課
豊岡農業改良普及センター
たじま農業協同組合

◆ 調査結果(但東地域)

《 紋枯れ病・葉いもち病 》

No.	地区	調査ほ場	品種	田植え	紋枯れ病発生程度	葉いもち病発生程度
33	畑	ミノヤ 1007	コシヒカリ(つちかおり)	5/14	無	無
34	河本	センボンガキ 17-1	コシヒカリ	5/15	無	無
35	相田	ウメツボ 1015	コシヒカリ	5/16	無	無
36	久畑	シモガワラ 933, 934	コシヒカリ	5/13	無	無
37	三原	サルユウ 662	コシヒカリ(つちかおり)	5/9	無	無
38	坂野	ナガミ 1245	コシヒカリ(つちかおり)	5/15	無	無
39	中藤	ヤマゾエ 737	マンゲツモチ	5/24	無	無
40	日場	ウメハラ 445	コシヒカリ	5/8	無	無

(※25株調査)

《 ウンカ類・カメムシ 》

No.	地区	セジロウンカ発生程度	トビイロウンカ発生程度	カメムシ捕虫数(頭)	備考
33	畑	無	無	無	
34	河本	無	無	無	
35	相田	無	無	1	
36	久畑	微	無	1	
37	三原	無	無	無	
38	坂野	無	無	無	
39	中藤	微	無	無	
40	日場	微	無	無	

(※10回網振り)

◆ 生育状況

No.	地区	品種	田植え	平成23年				平均値(平成19年～22年)			
				6月16日調査		7月5日調査		6月10日前後調査		7月10日前後調査	
				草丈	茎数	草丈	茎数	草丈	茎数	草丈	茎数
33	畑	つちかおり	5/14	36.5 cm	10.3 本	70.0 cm	20.8 本	33.0 cm	13.6 本	69.2 cm	18.8 本
38	坂野	つちかおり	5/15	29.0 cm	6.6 本	65.1 cm	17.1 本	32.1 cm	13.0 本	74.1 cm	21.8 本

(※10株平均値)

◆ 病害虫発生状況と今後の管理について

☆ いもち病

いもち病は、今回の調査ほ場では確認されませんでした。

いもち病は25～28℃前後で湿度が高いと発生しやすくなります。稲は日照不足により、軟弱な生育をしており、今後の天候により、葉いもち病の多発も心配されるので、ほ場をよく観察しましょう。

☆ 紋枯病

紋枯病の発生は、今回の調査ほ場では確認されませんでした。

紋枯病は高温年で発生が多くなります。昨年発生したほ場では特に注意が必要です。あぜぎわからよく発生しますので、稲の株もとに病斑がないかよく観察しましょう。

☆ ウンカ類・カメムシ類

ウンカの発生は少ない状況ですが、今後の発生予察情報に注意しましょう。また、カメムシは、一部の調査ほ場で確認をしました。

カメムシは、特にイネ科雑草の穂が大好きです。田んぼの中のヒエなどは早期に抜き取りましょう。出穂2週間前までに、あぜの草刈りを行いましょう。それ以降は、雑草が穂をつけないようにこまめに草刈りを行いましょう。

☆ 水管理

中干しを遅らせているほ場が見受けられましたが、茎数が確保され次第、速やかに中干しを行って下さい。

☆ 農薬を散布する場合、栽培暦をよく確認し、隣接する野菜ほ場などに飛散しないように注意しましょう。