

調査結果速報

豊岡市コウトリ共生部 農業共済課
豊岡農業改良普及センター
たじま農業協同組合

◆ 調査結果(豊岡・城崎地域) 《 紋枯れ病・葉いもち病 》

No.	地区	調査ほ場	品種	田植え	紋枯れ病 発生程度	葉いもち病 発生程度
1	佐野	コタンダ 15	コシカリ	5/14	無	無
2	下鶴井	ウエツボ 1262	マンゲツモチ	5/23	無	無
3	栄町	シモナカオリ 1041-1	コシカリ	5/15	無	無
4	福田	シカガツホ 69-1	コシカリ	5/20	無	無
5	大篠岡	ニシデ 930-1,2	コシカリ	5/17	無	無
6	清冷寺	カイワラ 400	コシカリ	5/18	無	少
7	大谷	コタ 1057	コシカリ	5/14	無	無
8	気比	ノタイ 1827	コシカリ	4/30	無	無
9	三宅	ツカバタ 1154	コシカリ	5/8	無	少
10	来日	ナカタ 507	コシカリ	5/5	無	無
11	今津	ナカドウリ 27-1	コシカリ	5/12	無	無

(※25株調査)

《 ウンカ類・カメムシ 》

No.	地区	セジロウンカ 発生程度	トビイロウンカ 発生程度	カメムシ 捕虫数(頭)	備考
1	佐野	無	微	無	
2	下鶴井	無	無	無	
3	栄町	無	無	無	
4	福田	無	無	無	
5	大篠岡	無	無	無	
6	清冷寺	無	無	無	
7	大谷	無	無	無	
8	気比	無	無	無	
9	三宅	無	無	無	
10	来日	無	無	無	
11	今津	無	無	無	

(※10回網振り)

◆ 生育状況

				平成23年				平均値(平成19年～22年)			
				6月16日調査		7月5日調査		6月10日前後調査		7月10日前後調査	
No.	地区	品種	田植え	草丈	茎数	草丈	茎数	草丈	茎数	草丈	茎数
5	大篠岡	コシカリ	5/17	24.3 cm	4.3 本	62.6 cm	14.3 本	28.5 cm	13.3 本	72.9 cm	23.0 本
7	大谷	コシカリ	5/14	31.0 cm	11.2 本	76.2 cm	24.4 本	32.5 cm	16.7 本	73.5 cm	23.3 本
11	今津	コシカリ	5/12	29.7 cm	12.3 本	69.7 cm	25.1 本	35.5 cm	18.7 本	74.5 cm	22.2 本

(※10株平均値)

◆ 病虫害発生状況と今後の管理について

☆ いもち病

いもち病は、今回の調査ほ場で一部確認されました。

いもち病は25～28℃前後で湿度が高いと発生しやすくなります。今後の天候により、葉いもち病の発生も心配されるので、ほ場をよく観察しましょう。

☆ 紋枯病

紋枯病は、今回の調査ほ場では確認されませんでした。

紋枯病は高温年で発生が多くなります。昨年発生したほ場では特に注意が必要で、あぜざわからよく発生します。稲の茎に病斑が発生していないかよく観察しましょう。

☆ ウンカ類・カメムシ類

ウンカは、調査ほ場では一部確認されました。カメムシは、確認されませんでした。

カメムシは、特にイネ科雑草の穂が大好きです。田んぼの中のヒエなどは早期に抜き取りましょう。出穂2週間前までに、あぜやほ場周辺の耕作放棄地の草刈りを行いましょう。それ以降は、雑草が穂をつけないようにこまめに草刈りを行いましょう。

☆ 水管理

中干しを遅らせているほ場が見受けられましたが、茎数が確保され次第、速やかに中干しを行って下さい。

☆ 農薬を散布する場合、隣接する野菜ほ場などに飛散しないように注意しましょう。